

SEDALPAN GEL

PRIMA DELL'USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

-Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.

-Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE: SEDALPAN GEL

COMPOSIZIONE: 100 g di gel contengono: **PRINCIPI ATTIVI:** Nicotinato di metile mg 500; Salicilato di dietilamina g 10. **ECCIPIENTI:** Alcool isopropilico; Glicerolo; Idrossietilcellulosa; Propile p-idrossibenzoato; Metile p-idrossibenzoato; Essenza eucaliptolo; Essenza di verbena; Acqua demineralizzata.

COME SI PRESENTA.

SEDALPAN GEL si presenta in forma di gel; ogni tubo contiene 40 g di gel.

CHE COSA E'.

SEDALPAN GEL è un farmaco per uso topico per dolori articolari e muscolari a base di derivato dell'acido salicilico.

TITOLAR

E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.

TEOFARMA S.r.l.. Sede: Via Flli Cervi, 8- Valle Salimbene (PV). Stab.: Viale Certosa 8/A-Pavia.

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE.

TEOFARMA S.r.l. Sede: Via Flli Cervi, 8 Valle Salimbene (PV). Stab. Viale Certosa 8/A-Pavia.

PERCHE' SI USA.

SEDALPAN GEL si usa per il trattamento coadiuvante locale di affezioni dolorose dell'apparato osteo-articolare e muscolare di origine reumatica e traumatica: torcicollo, dolori intercostali, distorsioni e strappi muscolari.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO.

SEDALPAN GEL non deve essere usato nel caso di ipersensibilità già nota verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; in particolare verso metile gentsitato e metile salicilato.

E' opportuno consultare il medico nel caso in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

Non utilizzare in età pediatrica.

Vedasi anche capitolo relativo a GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO.

QUANDO PUO' ESSERE USATO SOLO DOPO AVERE CONSULTATO IL MEDICO.

In gravidanza e nell'allattamento SEDALPAN GEL deve essere usato solo dopo avere consultato il medico ed avere valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO.

In gravidanza e nell'allattamento SEDALPAN GEL deve essere usato solo sotto controllo medico, dopo averlo consultato e avere valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

PRECAUZIONI PER L'USO.

Da utilizzare solo su cute integra. Lavarsi le mani dopo l'uso. Uso esterno.

SEDALPAN GEL contiene metile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche (eventualmente di tipo ritardato).

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE.

Per la possibilità di insorgenza di interazione non utilizzare contemporaneamente altri prodotti per uso topico.

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE.

Applicare solamente su cute sana evitando il contatto con gli occhi, le mucose e altre parti delicate del corpo. Utilizzare con prudenza e in dosi ridotte nei bambini sopra i sei anni e nei soggetti con pelle delicata.

L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione e produrre effetti indesiderati. Se si verificasse una reazione allergica, (persistente arrossamento o gonfiore della pelle e/o delle mucose, prurito, difficoltà respiratoria, collasso), interrompete immediatamente l'uso del medicinale e consultate il vostro medico.

L'eventuale arrossamento transitorio della cute, nel punto di applicazione del medicinale, è espressione dell'azione iperemizzante del nicotinato di metile. Attendere la regressione dell'arrossamento prima di effettuare una successiva applicazione.

Il medicinale contiene derivati dell'acido benzoico; l'acido benzoico è un debole irritante di cute, occhi e mucose; può causare allergia e asma; può aumentare il rischio di ittero nei neonati.

COME USARE QUESTO MEDICINALE.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Frizionare leggermente uno strato del medicinale sulla parte dolente fino a completo assorbimento. Si avvertirà allora una sensazione di calore cui seguirà l'effetto analgesico. Il trattamento può essere ripetuto 2-4 volte nel corso della giornata a seconda dell'intensità del dolore.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE.

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di SEDALPAN GEL avvertite immediatamente il vostro medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI.

L'uso prolungato può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

L'eventuale transitorio arrossamento della cute nel punto di applicazione è espressione dell'azione del medicinale. Se l'arrossamento è persistente, accompagnato o meno da gonfiore delle mucose, prurito, difficoltà respiratoria, collasso, interrompere immediatamente il trattamento e consultate il vostro medico o farmacista.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori.

Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (Modello B)

SCADENZA E CONSERVAZIONE.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

E' importante tenere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola sia il foglio illustrativo.

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE: Giugno 2010