

SORBICLIS

36,00 g/120 ml + 0,24 g/120 ml soluzione rettale
Bambini soluzione rettale. Contenitore monodose 120 ml

COMPOSIZIONE

Sorbiclis 36,00 g/120 ml + 0,24 g/120 ml

100 ml contengono: PRINCIPI ATTIVI: Sorbitolo al 70% non cristallizzabile g 30,00; Dioctilsodiosulfosuccinato g 0,20. ECCIPIENTI: Metile p-idrossibenzoato sodico; Acqua depurata.

Sorbiclis bambini soluzione rettale

100 ml contengono: PRINCIPI ATTIVI: Sorbitolo al 70% non cristallizzabile g 10,00; Dioctilsodiosulfosuccinato g 0,008. ECCIPIENTI: Metile p-idrossibenzoato sodico; Acqua depurata.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Soluzione rettale.

Flacone 120 ml.

CATEGORIA FARMACO-TERAPEUTICA

Lassativo.

TITOLARE AIC

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.

Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

PRODUTTORE

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.

Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV) (*)

DMS Farmaceutici S.p.A.

Via Provinciale per Lecco, 78 - 22038 Tavernerio (CO)

(*) I lotti prodotti da Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. saranno preceduti dalla lettera S.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Stitichezza.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità verso i componenti del prodotto. Afezioni ano-rettali con lesioni della mucosa.

Ostruzione meccanica delle vie biliari. Insufficienza epatica. Calcolosi biliare.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Non usare lassativi se sono presenti dolori addominali, nausea e vomito.

INTERAZIONI

Questo prodotto non va usato insieme a paraffina liquida, ad altri medicinali ed a olio minerale o lassativi che lo contengono.

AVVERTENZE

Non usare per trattamenti protratti. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso continuativo dei lassativi può provocare assuefazione o danno di diverso tipo.

Se la costipazione è ostinata consultare il medico.

In gravidanza o durante l'allattamento usare solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

DOSE MODO E TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE

Tutto il contenuto del flacone per un clistere. Premere a fondo il copricannula in modo da forare la membrana di sigillo.

Non superare le dosi consigliate.

EFFETTI INDESIDERATI

Il prodotto è ben tollerato. Non sono stati segnalati fenomeni di intolleranza né di fastidio all'applicazione.

Solo nei bambini, occasionalmente, può riscontrarsi transitoria incontinenza con espulsione rapida dell'inoculo.

Nel caso insorgessero effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo rivolgersi al medico o al farmacista.

VALIDITÀ DEL PREPARATO

ATTENZIONE: non utilizzare il medicinale oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.

Ultima revisione: Dicembre 2005.