

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

BECHILAR 3 mg/ml sciroppo

Destrometorfano bromidrato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei. Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5-7 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Bechilar e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Bechilar
3. Come usare Bechilar
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Bechilar
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Bechilar e a cosa serve

Bechilar sciroppo è un sedativo della tosse con azione a livello centrale. Bechilar sciroppo si usa per calmare la tosse.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Bechilar

Non prenda Bechilar

- Se è allergico al Destrometorfano bromidrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6.
- Se soffre di disturbi cronici a livello respiratorio.
- Se sta assumendo medicinali per la depressione chiamati inibitori delle monoamino-ossidasi (I-MAO, medicinali utilizzati nella cura dei disturbi dell'umore) o li ha assunti nelle ultime due settimane.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Bechilar se lei :

- è asmatico poiché il farmaco è sconsigliato in pazienti asmatici.
- soffre di problemi di fegato

In mancanza di una risposta terapeutica entro pochi giorni, consultare il medico.

Sono stati riportati casi di abuso di destrometorfano, compresi casi in adolescenti e bambini. La maggior parte dei casi riportati è di pazienti con storia di alcolismo e/o abuso di stupefacenti e/o disturbi psichiatrici.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico:

- Gravidanza e allattamento (vedere *Gravidanza e allattamento*)
- Bambini di età inferiore a 2 anni (vedere *Bambini*)
- Interazioni con medicinali o alimenti (vedere *Altri medicinali e Bechilar, Bechilar con alcol*)
- Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale (vedere *Bechilar contiene fruttosio, Metile para-idrossibenzoato e Propile para-idrossibenzoato*).

Bambini

Nei bambini di età inferiore a 2 anni Bechilar deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Altri medicinali e Bechilar

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica:

- Medicinali per la depressione chiamati inibitori delle mono amino-ossidasi (I-MAO, medicinali utilizzati nella cura dei disturbi dell'umore) perché possono causare gravi reazioni avverse, compresa la sindrome serotoninergica .
- Farmaci sedativi come benzodiazepine o sostanze correlate.
- Medicinali per la depressione chiamati inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o antidepressivi triciclici in quanto può verificarsi una sindrome serotoninergica.

Non prenda Bechilar contemporaneamente e nelle settimane successive ad una terapia con antidepressivi (vedere il paragrafo "Non prenda Bechilar").

In particolare informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto:

- medicinali per trattare la depressione come fluoxetina, paroxetina, sertralina e bupropione (vedere paragrafo 2. "Non prenda Bechilar");
- medicinali per trattare i dolori gravi o per ridurre i sintomi da astinenza nei casi di dipendenza (metadone);
- medicinali per trattare le malattie psichiatriche (aloperidolo, tioridazina, perfenazina);
- medicinali per trattare i disturbi del cuore (amiodarone, chinidina, propafenone);
- medicinali per trattare le anomalie del ritmo cardiaco (flecainide);
- medicinali per ridurre il livello di calcio nel sangue e trattare una disfunzione dell'organismo dovuta ad una ridotta secrezione dell'ormone che regola tali livelli nel sangue (iperparatiroidismo) come cinacalcet;
- medicinali utili per impedire lo sviluppo di funghi (miceti) (terbinafina).

L'uso concomitante di Bechilar e di medicinali sedativi o per dormire (ad esempio benzodiazepine) aumenta il rischio di sonnolenza, difficoltà a respirare (depressione respiratoria), coma e può essere pericoloso per la vita. Per questo motivo l'uso concomitante deve essere preso in considerazione solo se non sono possibili altre alternative di trattamento.

Tuttavia, se il medico o il farmacista vi prescrivono o vi consigliano Bechilar insieme a medicinali sedativi, la dose e la durata del trattamento concomitante devono essere limitate dal medico. Informi il medico o il farmacista di tutti i medicinali sedativi che sta assumendo e segua attentamente le raccomandazioni sul dosaggio fornite dal medico. Può essere utile informare amici o parenti in merito ai segni e sintomi sopradescritti. Contatti il medico quando si presentano tali sintomi.

Bechilar con alcol

E' sconsigliata l'assunzione di alcol mentre è in trattamento con questo medicinale perché può accentuare gli effetti indesiderati del farmaco.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non usare durante la gravidanza e l'allattamento, se non in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Il farmaco può dare sonnolenza, di ciò si deve tenere conto in quanto potrebbe compromettere la guida di autoveicoli o le operazioni che richiedono integrità del grado di vigilanza.

Bechilar contiene fruttosio, Metile para-idrossibenzoato e Propile para-idrossibenzoato

Se il medico le ha detto che ha una intolleranza ad alcuni zuccheri, come il fruttosio, lo contatti prima di iniziare a prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene Metile para-idrossibenzoato e Propile para-idrossibenzoato tra gli eccipienti pertanto può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come prendere Bechilar

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Quanto

Adulti: un cucchiaino da tè da 1 a 3 volte al giorno.

Uso nei bambini e negli adolescenti

Ragazzi e bambini al di sopra dei due anni: mezzo-un cucchiaino da caffè da 1 a 3 volte al giorno, a seconda dell'età.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

In mancanza di una risposta terapeutica entro pochi giorni consultare il medico, non usare per più di 5 - 7 giorni.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Modalità di somministrazione

Ingerire per via orale.

Se prende più Bechilar di quanto deve

Contatti immediatamente il suo medico o il più vicino ospedale.

Il destrometorfano può provocare, a dosi elevate, nausea, vomito, vertigini, lieve sonnolenza, eccitazione, disturbi gastrointestinali e depressione respiratoria.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati sono rari. Possono insorgere:

Patologie del sistema nervoso:

- sonnolenza;
- vertigini.

Patologie gastrointestinali:

- disturbi gastrointestinali;
- nausea;
- vomito;

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione **all'indirizzo** <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Bechilar

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Bechilar

- Il principio attivo è il destrometorfano bromidrato. 100 ml di sciroppo contengono Destrometorfano bromidrato 300 mg.
- Gli altri componenti sono Fruttosio, Glicerolo, Acido citrico monoidrato, Sodio idrossido, Aroma amarena, Potassio acesulfame, Metile p-idrossibenzoato, Propile p-idrossibenzoato, Acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Bechilar e contenuto della confezione

BECHILAR si presenta in forma di sciroppo.

Il contenuto della confezione è 1 flacone di sciroppo da 100 ml

Titolare dell'autorizzazione all'Immissione in Commercio

MONTEFARMACO OTC S.p.A.- Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)

Produttore

Istituto De Angeli Srl , Località Prulli , 50066 Reggello (FI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: