Foglio illustrativo: istruzioni per il paziente

FERRITIN COMPLEX 62,5 mg / 8 ml + 0,3 mg / 8 ml soluzione orale
Complesso gluconato ferrico sodico e calcio folinato idrato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Ferritin Complex e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Ferritin Complex
3. Come prendere Ferritin Complex
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Ferritin Complex
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cos'è Ferritin Complex e a cosa serve

Ferritin Complex contiene due principi attivi, il complesso gluconato ferrico sodico e il calcio folinato idrato. Il complesso gluconato ferrico sodico fornisce all'organismo il ferro necessario per riportare nella norma i valori dei globuli rossi e dell'emoglobina (valori eritrocitari ed emoglobinici). Il calcio folinato idrato è un supplemento di acido folico, una vitamina importante per la produzione del DNA, per prevenire le malformazioni del feto durante la gravidanza e per la produzione dei globuli rossi.

Questo medicinale è indicato nel trattamento della riduzione del numero dei globuli rossi nel sangue a causa di una carenza di ferro (anemia sideropenica) o di acido folico (anemia da carenza di folati) durante la gravidanza, nel periodo successivo al parto e durante l'allattamento al seno (vedere il paragrafo "Gravidanza e allattamento").

Cosa deve sapere prima di prendere Ferritin Complex

Non prenda Ferritin Complex
- se è allergico al complesso gluconato ferrico sodico, al calcio folinato idrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di infiammazioni croniche del pancreas (pancreatiti croniche);
- se soffre di gravi malattie del sangue (anemie aplastiche, emolitiche e sideroacrestiche);
- se soffre di una malattia ereditaria caratterizzata da un accumulo di ferro nell'organismo (emocromatosi).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Ferritin Complex.

Altri medicinali e Ferritin Complex
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non prenda questo medicinale se sta assumendo tetracicline, antibiotici usati per il trattamento delle infezioni perché il ferro e i suoi derivati ne possono ridurre gli effetti.

Gravidanza e allattamento

Documento reso disponibile da AIFA il 30/03/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Se è in stato di gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Ferritin Complex è indicato nel trattamento della carenza di ferro e di acido folico che si possono manifestare durante la gravidanza e l'allattamento al seno (vedere il paragrafo "Che cos'è Ferritin Complex e a cosa serve").

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

Ferritin Complex contiene saccarosio
Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
Può essere dannoso per i denti.

Ferritin Complex contiene p-idrossibenzoati
Ferritin Complex contiene metile p-idrossibenzoato, etile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato, può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Ferritin Complex contiene sodio
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per flaconcino, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Ferritin Complex contiene etanolo
Questo medicinale contiene 1,8 mg di alcol (etanolo, contenuto nell' aroma di crema olandese) per flaconcino da 8 ml. Tale quantità equivale a meno di 1 ml di birra o 1 ml di vino.
La piccola quantità di alcol in questo medicinale non produrrà effetti rilevanti.

Come prendere Ferritin Complex

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 flaconcino, 2 volte al giorno, durante i pasti.

Tolga il sigillo di chiusura del flacone e prema sul pistone in alto, in modo da far cadere il contenuto del tappo nella soluzione sottostante.

Agiti per qualche minuto finché il contenuto si scioglie completamente.

Può ingerire direttamente la soluzione ottenuta o può diluirla prima in un bicchiere di acqua o di altre bevande.

Se prende più Ferritin Complex di quanto deve
In caso di assunzione di una dose eccessiva di questo medicinale, si possono verificare temporanei disturbi all'intestino (vedere il paragrafo "possibili effetti indesiderati").

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Ferritin Complex avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Ferritin Complex
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Possibili effetti indesiderati

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 30/03/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Come tutti i medicinale, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere valutata dai dati disponibili):
- diarrea, bruciore di stomaco (pirosi), nausea, vomito in particolare se assume dosi eccessive del medicinale (vedere "se prende più Ferritin Complex di quanto deve");
- stitichezza (stipsi), specialmente se prende Ferritin Complex per molto tempo;
- colorazione scura delle feci, priva di significato patologico.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Come conservare Ferritin Complex

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione dopo "Scadenza".
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Ferritin Complex
I principi attivi sono complesso gluconato ferrico sodico e calcio folinato idrato. Ogni flaconcino (8 ml) contiene 177,5 mg di complesso gluconato ferrico sodico (corrispondente a 62,5 mg di Fe^{3+}). Ogni tappo serbatoio contiene 0,3 mg di calcio folinato idrato.
Gli altri componenti:
- nella soluzione sono: glicerina, saccarosio, metile p-idrossibenzoato, etile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acido deidroacetico (sale sodico), aroma di crema olandese, acqua depurata;
- nel tappo serbatoio sono: mannitolo, saccarosio.

Descrizione dell'aspetto di Ferritin Complex e contenuto della confezione
Confezione da 10 flaconcini con tappo serbatoio.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
ABC Farmaceutici S.p.A. – Corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino – Italia

Concessionario esclusivo per la vendita in Italia
SOFAR S.p.A. – Trezzano Rosa (MI)

Produttore
ABC Farmaceutici S.p.A. – Canton Moretti, 29 – 10015 San Bernardo d'Ivrea (TO) – Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 30/03/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).