

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

CANTABILIN 300 mg compresse rivestite

Imecromone

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Cantabilin e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Cantabilin
3. Come prendere Cantabilin
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Cantabilin
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è CANTABILIN e a cosa serve

Cantabilin contiene il principio attivo imecromone, che fa parte di un gruppo di medicinali utilizzati per la terapia biliare. È usato per trattare i disordini della colecisti e della produzione di bile.

Cantabilin è usato per il trattamento di:

- alterazione del flusso della bile dalla cistifellea (discinesia biliare)
- indigestione (dispepsia) causata da produzione di bile alterata
- spasmi delle vie biliari e della valvola che regola il deflusso della bile (sfintere di Oddi)

Cantabilin è anche usato come coadiuvante per il trattamento di:

- infiammazione della colecisti
- calcoli biliari (litiasi colecistica)
- dopo la rimozione chirurgica della colecisti
- problemi da lievi a moderati della funzione epatica (insufficienza epatica da lieve a moderata).

2. Cosa deve sapere prima di prendere CANTABILIN

Non prenda Cantabilin:

- se è allergico all'imecromone o a uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Cantabilin se ha:

- un'ostruzione delle vie biliari
- gravi problemi di funzionalità epatica.

Altri medicinali e Cantabilin

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gli effetti di Cantabilin sul feto o sul neonato allattato al seno sono sconosciuti, quindi l'uso di Cantabilin durante la gravidanza o l'allattamento non è raccomandato.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Cantabilin non influenza la capacità di guidare o di usare macchinari.

Cantabilin contiene giallo tramonto, saccarosio e glucosio.

Il prodotto contiene:

- giallo tramonto, un agente colorante che può causare reazioni allergiche
- glucosio liquido e saccarosio; se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere CANTABILIN

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 - 2 compresse due o tre volte al giorno.

Non superi la dose giornaliera raccomandata.

Se prende più Cantabilin di quanto deve

Se lei o qualcun altro ha accidentalmente preso troppe compresse di Cantabilin, informi il medico o vada al più vicino ospedale, portando con sé la confezione, se possibile.

Se dimentica di prendere Cantabilin

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare tra 1 e 10 persone su 100):

- diarrea

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- reazioni anafilattiche, inclusi orticaria, prurito, difficoltà a respirare, gonfiore del viso, delle labbra, della gola o della lingua (edema), che possono evolvere a shock anafilattico

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CANTABILIN

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Cantabilin:

Il principio attivo è imecromone; ogni compressa contiene 300 mg

Gli altri componenti sono:

amido di mais, cellulosa microcristallina, gomma arabica, silice precipitata, magnesio stearato, talco, destrina, glucosio liquido, saccarosio, eritrosina (E 127), giallo tramonto (E 110), cera carnauba.

Vedere fine della sezione 2 per ulteriori informazioni su giallo tramonto, saccarosio e glucosio.

Descrizione dell'aspetto di Cantabilin e contenuto della confezione

Cantabilin compresse rivestite sono confezionate in blister da 30 o 40 compresse.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

GRÜNENTHAL ITALIA S.r.l.

Via Carlo Bo,11 – 20143 Milano

Italia

Produttore

FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A.

Stabilimento di produzione: Origgio (VA)

Via Di Vittorio 2

Italia

Per qualsiasi informazione su questo medicinale, contatti il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato in