D I O S V E N " 300 mg compresse" 20 compresse

COMPOSIZIONE
Diosven compresse - 1 compressa contiene: **Principio attivo**: Diosmina mg 300.
Eccipienti: amido di mais; lattosio; polivinilpirrolidone; talco; magnesio stearato.

Forma farmaceutica e contenuto: compresse, 20 compresse da mg 300 in blister

Categoria farmaco-terapeutica Sostanze capillaroprotettrici.

TITOLARE AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO:
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.r.l. Strada Solaro n. 75/77 - Sanremo (IM).

PRODUTTORE
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.r.l. Via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (IM).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO
Uso in gravidanza
La sicurezza del farmaco in gravidanza non è stata determinata, pertanto è opportuno non somministrare il prodotto durante la gravidanza.

INTERAZIONI
Il prodotto può essere somministrato senza rischio in concomitanza con altri farmaci compresi gli anticoagulanti.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Mediamente 1 compressa per 3 volte al dì, salvo diversa prescrizione medica.

EFFETTI INDESIDERATI
Raramente l'uso del **DIOSVEN** alle dosi consigliate in terapia, dà luogo ad effetti collaterali.
Vengono comunque riportati rari casi di gastralgie, nausea, diarrea, vertigini sempre di lieve entità e tali da non richiedere l'interruzione del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di qualsiasi effetto indesiderato anche non descritto nel foglio illustrativo.
.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Il prodotto non deve essere utilizzato oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.
Il periodo di validità si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

TENERE IL MEDICINALE LONTANO DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: 17/05/2012

D I O S V E N 4% crema - tubo 40 g

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Diosmina

COMPOSIZIONE : 100 g di pomata contengono: **Principio attivo**: Diosmina g 4.
Eccipienti: glicerile monostearato; dodecalene; alcool cetilstearilico; polisorbato 20; cera liquida; lanolina; metile p-idrossibenzoato; propile p-idrossibenzoato; essenza; acqua depurata.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Crema, tubo da g 40.

CATEGORIA FARMACO-TERAPEUTICA : sostanze capillaroprotettrici.

TITOLARE AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO :
- LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.r.l. - Strada Solaro 75/77 - Sanremo (IM).

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE :
PRODUTTORE:
- ***Semilavorato e finito***
  SOFAR S.p.A. - Via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (MI)
- ***Produzione completa e controllo***

LISAPHARMA S.p.A – Via Licinio, 11 – Erba (CO)
CONTROLLORE FINALE:
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.r.l. - Via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (IM).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO
La crema non deve essere mai applicata su eczemi umidi.
Uso in gravidanza
La sicurezza del farmaco in gravidanza non è stata determinata, pertanto è opportuno non somministrare il prodotto durante la gravidanza.

INTERAZIONI
Il prodotto può essere somministrato senza rischio in concomitanza con altri farmaci, ivi compresi gli anticoagulanti.

AVVERTENZE SPECIALI
L'uso del prodotto per applicazione topica può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso occorre interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Applicare la crema due o tre volte al giorno (o secondo altra prescrizione medica) sull'area interessata; aiutare la penetrazione della crema attraverso la cute mediante lieve massaggio con movimenti diretti dal basso verso l'alto.

EFFETTI INDESIDERATI
Non è da escludere la possibilità di insorgenza, specie a seguito di trattamenti prolungati di effetti irritativi cutanei.
Il rispetto delle istruzione nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di qualsiasi effetto indesiderato anche non descritto nel foglio illustrativo.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
Il prodotto non deve essere utilizzato oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.
Il periodo di validità si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:
17/05/2012

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).