

## LACTEOL

**10 miliardi polvere orale e 5 miliardi capsule rigide**

### CAPSULE E BUSTINE

*LACTOBACILLUS LB (L. fermentum e L. delbrueckii)*

#### **Composizione**

##### Capsule:

Una capsula contiene: Lactobacillus LB (L. fermentum e L. delbrueckii) (corpi microbici inattivati e liofilizzati) 5 miliardi.

Eccipienti: mezzo di coltura neutralizzato e liofilizzato, lattosio monoidrato, calcio carbonato, acido silicico, talco, magnesio stearato, lattosio anidro, gelatina.

##### Bustine:

Una bustina contiene: Lactobacillus LB (L. fermentum e L. delbrueckii) (corpi microbici inattivati e liofilizzati) 10 miliardi. Eccipienti: mezzo di coltura neutralizzato e liofilizzato, lattosio monoidrato, calcio carbonato, acido silicico, aroma banana-arancia, saccarosio.

#### **Forma farmaceutica**

20 capsule da g 0,235.

10 bustine da g 0,800.

#### **Categoria farmacoterapeutica**

Antidiarroico di origine microbica

#### **Titolare A.I.C.**

Bruschettini s.r.l. – Genova (Italia)

#### **Produttore**

Aptalis Pharma SAS – Houdan (Francia)

### **INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Tattamento sintomatico delle diarree da alterata flora batterica nel bambino e nell'adulto.

### **INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONOSCIUTE PRIMA DELL'USO DEL MEDICINALE**

#### **Controindicazioni**

Ipersensibilità nota verso il prodotto.

#### **Opportune precauzioni d'impiego**

Il prodotto può essere utilizzato in gravidanza e durante l'allattamento.

N.B.: nei lattanti sotto i due anni il prodotto deve essere usato unitamente a terapia reidratante. Sopra i due anni il trattamento con il prodotto non esclude una terapia di reidratazione, qualora necessaria. Il grado di reidratazione (per via orale o endovenosa) deve adattarsi alla gravità della diarrea, all'età e alle condizioni di salute del paziente.

#### **Interazioni con altri farmaci ed altre forme di interazione**

Non sono state segnalate interazioni con l'uso di altri farmaci sistemici né topici.

#### **Effetti sulla guida e sull'uso di macchine**

Il prodotto non interferisce sulla capacità di guidare né sull'uso di macchine.

## **ISTRUZIONI NECESSARIE E CONSUETE PER UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE**

### **Dose, modo e frequenza di somministrazione**

*Capsule:* da 2 a 4 capsule al giorno. In caso di diarree acute: 2 capsule 3 volte al dì il primo giorno, 2 capsule due volte al dì fino al secondo giorno dopo la scomparsa della sintomatologia.

*Bustine:* da 1 a 2 bustine al giorno. In caso di diarrea acuta: 1 bustina 3 volte al dì il primo giorno, 2 volte al giorno fino al secondo giorno dopo la scomparsa dei sintomi.

### **Durata del trattamento**

In relazione alla gravità della patologia, secondo le indicazioni del medico.

### **Indicazioni per l'uso**

*Capsule:* Ingerire una capsula bevendo acqua. Il contenuto della capsula può essere sciolto nel biberon con acqua o latte.

*Bustine:* Stemperare il granulato della bustina in mezzo bicchiere d'acqua. Il contenuto di una bustina può essere disciolto nel biberon con acqua o latte.

### **EFFETTI INDESIDERATI**

Alle dosi consigliate il prodotto è ben tollerato. È opportuno che il paziente comunichi al medico curante o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato, ove riscontrato.

### **SCADENZA**

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

### **Attenzione**

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

### **Precauzioni speciali per la conservazione del medicinale.**

Lacteol bustine: nessuna speciale precauzione per la conservazione.

Lacteol capsule: conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Data di revisione da parte della Agenzia Italiana del Farmaco: Novembre 2009.

**Titolare AIC: BRUSCHETTINI s.r.l. – Genova (Italia)**

Su licenza di: Aptalis Pharma S.A.

Stabilimento sito in Houdan (Francia), Route De Bu

Operazioni confezionamento secondario presso:

BRUSCHETTINI s.r.l. - Genova (Italia)