

**FOGLIO ILLUSTRATIVO**  
**Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore**

**GLICEROLO MARCO VITI prima infanzia 675 mg supposte**  
**GLICEROLO MARCO VITI bambini 1350 mg supposte**  
**GLICEROLO MARCO VITI adulti 2250 mg supposte**  
**GLICEROLO MARCO VITI prima infanzia 2,25 g soluzione rettale**  
**GLICEROLO MARCO VITI bambini 4,5 g soluzione rettale**  
**GLICEROLO MARCO VITI adulti 6,75 g soluzione rettale**  
Glicerolo

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è GLICEROLO MARCO VITI e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare GLICEROLO MARCO VITI
3. Come usare GLICEROLO MARCO VITI
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare GLICEROLO MARCO VITI
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Che cos'è GLICEROLO MARCO VITI e a cosa serve**

GLICEROLO MARCO VITI contiene il principio attivo glicerolo che appartiene alla categoria di medicinali lassativi, utilizzati per facilitare l'espulsione delle feci. Questo medicinale è indicato per il trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

**2. Cosa deve sapere prima di usare GLICEROLO MARCO VITI**

**Non usi GLICEROLO MARCO VITI**

- se è allergico al glicerolo ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di dolore addominale acuto o di origine sconosciuta;
- se ha nausea o vomito;
- se soffre di ostruzione o restringimento (stenosi) intestinale;

- se soffre di sanguinamento rettale di origine sconosciuta;
- se soffre di gonfiore dei vasi sanguigni presenti intorno all'ano (crisi emorroidale acuta) con dolore e sanguinamento;
- se è in grave stato di disidratazione.

### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere GLICEROLO MARCO VITI.

Se è anziano e/o non è in buone condizioni di salute informi il medico prima di usare questo medicinale.

Usi i medicinali che stimolano l'espulsione delle feci (lassativi) il meno frequentemente possibile e comunque per non più di 7 giorni. L'utilizzo dei lassativi per periodi di tempo maggiori, richiede la prescrizione del medico, dopo adeguata valutazione delle condizioni del paziente.

Se soffre di stitichezza che dura per lunghi periodi (cronica) o che è frequente, richieda sempre l'intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione dei medicinali e la sorveglianza durante la terapia. Consulti il medico quando la necessità del lassativo deriva da un improvviso cambiamento delle precedenti abitudini intestinali (frequenza e caratteristiche delle evacuazioni) che duri da più di due settimane o quando l'uso del lassativo non riesce a produrre effetti.

Beva almeno 6-8 bicchieri al giorno di acqua o altri liquidi per favorire l'ammorbidimento delle feci quando usa i lassativi.

Se usa eccessivamente, frequentemente o in modo scorretto i lassativi, potrebbe andare incontro a diarrea duratura con conseguente perdita di acqua, sali minerali (soprattutto potassio) e altre sostanze nutritive essenziali. Nei casi più gravi di abuso si può manifestare un'eccessiva perdita di liquidi (disidratazione) o un abbassamento dei livelli di potassio nel sangue (ipopotassiemia) che possono provocare problemi al cuore o all'attività dei muscoli, soprattutto se sta assumendo glicosidi cardiaci, diuretici o corticosteroidi durante il trattamento con questo medicinale.

L'abuso di lassativi, specialmente quelli di contatto (lassativi stimolanti), può causare dipendenza (la necessità di aumentare sempre di più il dosaggio), stitichezza cronica e perdita delle normali funzioni intestinali (atonìa intestinale).

In caso di stitichezza innanzitutto corregga le sue abitudini alimentari, assumendo un'adeguata quantità di fibre e acqua con la dieta quotidiana.

Nella maggior parte dei casi, una dieta equilibrata e ricca di acqua e fibre (crusca, verdure e frutta) può risolvere durevolmente il problema della stitichezza. Molte persone pensano di soffrire di stitichezza se non riescono ad evacuare ogni giorno. Questa è una convinzione errata poiché questa situazione è del tutto normale per un gran numero di individui. La stitichezza vera e propria si verifica quando le evacuazioni sono in numero ridotto rispetto alle proprie abitudini e sono associate all'emissione di feci dure. Se gli episodi di stitichezza si presentano ripetutamente deve essere consultato il medico.

### **Bambini**

Nei bambini al di sotto dei 12 anni di età è raccomandato usare GLICEROLO MARCO VITI solo dopo un consulto medico.

### **Altri medicinali e GLICEROLO MARCO VITI**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non ci sono informazioni sull' interazione di GLICEROLO MARCO VITI con altri medicinali.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Prenda questo medicinale durante la gravidanza e l'allattamento solo se necessario e sempre dietro controllo diretto del medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari. Tuttavia, osservi la sua risposta al medicinale poiché possono manifestarsi effetti indesiderati, pertanto è bene conoscere la reazione al farmaco prima di guidare veicoli o usare macchinari.

## **3. Come usare GLICEROLO MARCO VITI**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose corretta è quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione. Usi inizialmente le dosi minime previste.

### **GLICEROLO MARCO VITI supposte**

Adulti e adolescenti di età maggiore di 12 anni: la dose raccomandata è 1 supposta adulti al bisogno fino a un massimo di 2 supposte al giorno.

Tolga la supposta dal suo contenitore e la inumidisca, se necessario, per facilitare l'introduzione rettale.

Se le sembra che le supposte siano troppo molli, metta i contenitori nell'acqua fredda prima di aprirli.

### **GLICEROLO MARCO VITI soluzione rettale**

Adulti e adolescenti (12-18 anni): la dose raccomandata è 1 contenitore monodose adulti da 6,75 g al bisogno fino a un massimo di 2 contenitori monodose al giorno.

Tolga il tappino dal contenitore monodose senza mai afferrare il soffiello, altrimenti farebbe fuoriuscire il medicinale prima dell'utilizzo.

Se necessario, usi una goccia della soluzione di medicinale per inumidire (lubrificare) la cannula prima di introdurla nel retto e prema il soffiello. Estragga la cannula tenendo premuto il soffiello.

Usi il contenitore per una sola somministrazione; elimini l'eventuale medicinale residuo.

Usi i lassativi il meno frequentemente possibile e per non più di sette giorni (vedere il paragrafo Avvertenze e precauzioni).

## Uso nei bambini

### **GLICEROLO MARCO VITI supposte**

Bambini di età compresa tra 2 anni e 11 anni: la dose raccomandata è 1 supposta bambini al bisogno fino a un massimo di 2 supposte al giorno.

Bambini di età compresa tra 1 mese e 2 anni: la dose raccomandata è 1 supposta prima infanzia al bisogno fino a un massimo di 2 supposte al giorno.

### **GLICEROLO MARCO VITI soluzione rettale**

Bambini di età compresa tra 6 anni e 11 anni: la dose raccomandata è 1 contenitore monodose bambini da 4,5 g al bisogno fino a un massimo di 2 contenitori monodose al giorno.

Bambini di età compresa tra 2 anni e 6 anni: la dose raccomandata è 1 contenitore monodose prima infanzia da 2,25 g al bisogno fino a un massimo di 2 contenitori monodose al giorno.

### **Se usa più GLICEROLO MARCO VITI di quanto deve**

Se usa questo medicinale troppo spesso, per troppo tempo o in quantità eccessive si possono manifestare dolori addominali e diarrea persistente che causano perdite di liquidi, sali minerali (specialmente potassio) e altre sostanze nutritive essenziali che devono essere rimpiazzate (vedere il paragrafo Avvertenze e precauzioni).

I sintomi dell'alterazione dell'equilibrio dei sali presenti nell'organismo (squilibrio elettrolitico) sono: sete, vomito, indebolimento, gonfiore (edema), problemi alle ossa (osteomalacia) e abbassamento di una proteina presente nel sangue, l'albumina (ipoalbuminemia).

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di GLICEROLO MARCO VITI avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

- Dolori in forma di crampi isolati o coliche addominali e diarrea, con perdita di liquidi e sali minerali (elettroliti) più frequenti nei casi di stitichezza grave
- Irritazione a livello rettale

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. Come conservare GLICEROLO MARCO VITI

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### Cosa contiene GLICEROLO MARCO VITI

#### **GLICEROLO MARCO VITI prima infanzia 675 mg supposte**

- Il principio attivo è glicerolo. Ogni supposta prima infanzia contiene 675 mg di glicerolo
- Gli altri componenti sono: sodio stearato, sodio carbonato anidro.

#### **GLICEROLO MARCO VITI bambini 1350 mg supposte**

- Il principio attivo è glicerolo. Ogni supposta bambini contiene 1350 mg di glicerolo.
- Gli altri componenti sono: sodio stearato, sodio carbonato anidro.

#### **GLICEROLO MARCO VITI adulti 2250 mg supposte**

- Il principio attivo è glicerolo. Ogni supposta adulti contiene 2250 mg di glicerolo.
- Gli altri componenti sono: sodio stearato, sodio carbonato anidro.

#### **GLICEROLO MARCO VITI prima infanzia 2,25 g soluzione rettale**

- Il principio attivo è glicerolo. Ogni contenitore monodose prima infanzia contiene 2,25 g di glicerolo
- Gli altri componenti sono: camomilla estratto fluido, malva estratto fluido, amido pregelatinizzato, acqua depurata.

#### **GLICEROLO MARCO VITI bambini 4,5 g soluzione rettale**

- Il principio attivo è glicerolo. Ogni contenitore monodose bambini contiene 4,5 g di glicerolo.
- Gli altri componenti sono: camomilla estratto fluido, malva estratto fluido, amido pregelatinizzato, acqua depurata.

#### **GLICEROLO MARCO VITI adulti 6,75 g soluzione rettale**

- Il principio attivo è glicerolo. Ogni contenitore monodose adulti contiene 6,75 g di glicerolo.
- Gli altri componenti sono: camomilla estratto fluido, malva estratto fluido, amido pregelatinizzato, acqua depurata.

**Descrizione dell'aspetto di GLICEROLO MARCO VITI e contenuto della confezione**

GLICEROLO MARCO VITI prima infanzia 675 mg supposte. Astuccio da 6 supposte.

GLICEROLO MARCO VITI bambini 1350 mg supposte. Astuccio da 6 supposte.

GLICEROLO MARCO VITI adulti 2250 mg supposte. Astuccio da 6, 12 e 18 supposte.

GLICEROLO MARCO VITI prima infanzia 2,25 g soluzione rettale. Astuccio da 6 contenitori monodose.

GLICEROLO MARCO VITI bambini 4,5 g soluzione rettale. Astuccio da 6 contenitori monodose.

GLICEROLO MARCO VITI adulti 6,75 g soluzione rettale. Astuccio da 6 contenitori monodose.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore****Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Marco Viti Farmaceutici S.p.A. - Via Mentana, 38 - 36100 Vicenza - Italia.

**Produttore**

Zeta Farmaceutici S.p.A. - Via Galvani, 10 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**