Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

STERIDROLO 2,5 g polvere da solubilizzare in acqua
STERIDROLO 5 g polvere da solubilizzare in acqua

Cloramina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacistale ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Steridrolo e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Steridrolo
3. Come usare Steridrolo
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Steridrolo
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Steridrolo e a cosa serve

Steridrolo contiene il principio attivo cloramina che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che impediscono la crescita dei batteri, dei funghi, dei virus e di altri microrganismi. Inoltre, questo medicinale in presenza di ferite favorisce la cicatrizzazione.

Steridrolo è indicato per:
- disinfettare e pulire la pelle in caso di ferite superficiali di piccole dimensioni, piaghe da decubito di lieve entità (cioè che interessano solo lo strato più superficiale della pelle), scottature superficiali e non estese (ustioni di primo grado);
- disinfettare i genitali esterni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare Steridrolo

Non usi Steridrolo se:
- è allergico alla cloramina o a sostanze simili (sostanze che liberano cloro).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Steridrolo.

Non ingerire. Questo medicinale è solo per uso esterno. L'ingestione accidentale della soluzione disinfettante può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

Documento reso disponibile da AIFA il 14/01/2023
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Evitare il contatto con gli occhi. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

Altri medicinali e Steridrolo
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.
Ciò comprende anche le medicine senza ricetta. Questo perché Steridrolo può influenzare il modo in cui alcune medicine funzionano oppure perchè altre medicine possono influenzare il modo in cui Steridrolo agisce.

Non usi Steridrolo insieme ad altri medicinali usati per disinfettare e detergere.

Fertilità, gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari.

3. Come usare Steridrolo

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Disinfezione della pelle lesa
Bustine da 2,5 g: La dose raccomandata è di 2 bustine sciolte in mezzo litro di acqua.
Bustine da 5 g: La dose raccomandata è di 2 bustine sciolte in 1 litro di acqua.

Disinfezione dei genitali esterni
Bustine da 2,5 g: La dose raccomandata è di 1 bustina sciolta in 1 litro di acqua.
Bustine da 5 g: La dose raccomandata è di 1 bustina sciolta in 2 litri di acqua.

Ripeta la disinfezione 2-3 volte al giorno o secondo la prescrizione del medico.
Non superi le dosi raccomandate.

Se usa più Steridrolo di quanto deve
Se ha usato più Steridrolo di quanto deve, parli con un medico o vada subito in ospedale. Porti la confezione del medicinale con sé.
Se ingerisce accidentalmente la soluzione disinfettante può avere gravi conseguenze, che possono portare alla morte.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Steridrolo dopo aver indotto il vomito, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Documento reso disponibile da AIFA il 14/01/2023
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati che possono verificarsi sono elencati di seguito:

- irritazione agli occhi;
- intolleranza al medicinale, caratterizzata da bruciore o irritazione, che non richiede modifica del trattamento.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo:
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Steridrolo

- Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.
- Conservare a temperatura inferiore a 30 °C.
- Una volta preparata la soluzione per l'uso, conservare ben chiusa e al riparo dalla luce. La soluzione preparata è stabile per 3 mesi.
- Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Steridrolo

Steridrolo polvere da solubilizzare in acqua bustine da 2,5 g
- Il principio attivo è cloramina. Ogni bustina contiene 2,5 g di cloramina (pari a 0,625 g di cloro attivo).

Steridrolo polvere da solubilizzare in acqua bustine da 5 g
- Il principio attivo è cloramina. Ogni bustina contiene 5 g di cloramina (pari a 1,25 g di cloro attivo).

Descrizione dell'aspetto di Steridrolo e contenuto della confezione

Steridrolo polvere da solubilizzare in acqua bustine da 2,5 g
Confezione da 12 bustine da 2,5 g.

Steridrolo polvere da solubilizzare in acqua bustine da 5 g
Confezione da 10 bustine da 5 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Documento reso disponibile da AIFA il 14/01/2023
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67, Fraz. Granatieri, 50018 Scandicci (FI)

Produttori
L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67, Fraz. Granatieri, 50018 Scandicci (FI)

Sigmar Italia SpA, Via Sombreno 11, Almè (BG)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 14/01/2023

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).