Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

SUCRALFATO ARISTO 2 g polvere per sospensione orale
Sucralfato

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è SUCRALFATO ARISTO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere SUCRALFATO ARISTO
3. Come prendere SUCRALFATO ARISTO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare SUCRALFATO ARISTO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è SUCRALFATO ARISTO e a cosa serve

SUCRALFATO ARISTO contiene il principio attivo sucralfato, che appartiene alla categoria dei medicinali utilizzati per il trattamento dell'ulcera. Agisce formando una barriera protettiva sulle lesioni prevenendo ulteriori irritazioni causate dagli acidi prodotti nello stomaco.
Questo medicinale viene utilizzato per il trattamento di:
- lesioni allo stomaco (ulcera gastrica), e lesioni all'intestino (ulcera duodenale);
- infiammazione dello stomaco come manifestazione transitoria o permanente (gastrite acuta e gastrite cronica);
- disturbi allo stomaco dovuti all'uso di medicinali antinfiammatori appartenenti alla categoria dei FANS (farmaci antiinfiammatori non steroidei);
- infiammazione dell'esofago dovuta alla risalita di liquidi e/o cibi acidi (esofagite da reflusso).

2. Cosa deve sapere prima di prendere SUCRALFATO ARISTO

Non prenda SUCRALFATO ARISTO
- se è allergico al sucralfato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 08/09/2017

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- se sta assumendo medicinali antibiotici (tetracicline), utilizzati per il trattamento di infezioni da parte di batteri (Vedere paragrafo “Altri medicinali e SUCRALFATO ARISTO);
- se soffre di fenilchetonuria, una condizione in cui si hanno elevati livelli di piruvato nelle urine e di fenilalanina nel sangue, in quanto questo medicinale contiene aspartame;
- se il paziente è un neonato prematuro;

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere SUCRALFATO ARISTO.
Informi il medico ed usi questo medicinale con cautela evitando trattamenti prolungati nei seguenti casi:
- se soffre di problemi ai reni gravi (insufficienza renale);
- se soffre di disturbi nel movimento dei cibi nel tratto digerente, in quanto possono formarsi degli accumuli di materiale non digerito (bezoari).

B**ambini e adolescenti**
SUCRALFATO ARISTO non è raccomandato nei bambini a causa della mancanza di dati sulla sicurezza ed efficacia di questo medicinale.

Altri medicinali e SUCRALFATO ARISTO
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Il sucralfato può ridurre l’efficacia di medicinali utilizzati per il trattamento di infezioni da parte di batteri (tetracicline).

Se deve assumere altri medicinali lo faccia almeno due ore prima o dopo l’assunzione di SUCRALFATO ARISTO.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Se è in stato di gravidanza o se sta allattando con latte materno usi questo medicinale soltanto in casi di effettiva necessità e sotto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera la capacità di guida di veicoli e dell’utilizzo di macchinari.

SUCRALFATO ARISTO contiene sorbitolo e aspartame
Questo medicinale contiene sorbitolo, un tipo di zucchero. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
Questo medicinale contiene aspartame, una fonte di fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria (vedere il paragrafo “Non prenda SUCRALFATO ARISTO”).

3. Come prendere SUCRALFATO ARISTO

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 08/09/2017
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.
La dosa raccomandata è di una bustina di granulato 2 volte al giorno, salvo diversa prescrizione medica.
Prenda il medicinale a stomaco vuoto, dopo aver sciolto il granulato in un pò d' acqua.

Se prende più SUCRALFATO ARISTO di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di SUCRALFATO ARISTO avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere SUCRALFATO ARISTO
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

- formazione di accumuli di materiale non digerito (bezoari).
- disturbi gastroenterici (diarrea, flatulenza, nausea, vomito, senso di pienezza gastrica);
- stitichezza, per trattamenti prolungati;
- secchezza della bocca;
- eruzione cutanea e prurito;
- vertigini;
- insonnia;
- mal di testa (cefalea).

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare SUCRALFATO ARISTO

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.".
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al medicinale correttamente conservato.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 08/09/2017
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene SUCRALFATO ARISTO
- Il principio attivo è sucralfato. Ogni bustina contiene 2 g di sucralfato.
- Gli altro componenti sono sorbitolo, aspartame e aroma pandoro.

Descrizione dell’aspetto di SUCRALFATO ARISTO e contenuto della confezione
Confezione da 30 bustine di granulato.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8 - 10
13435 Berlino
Germania

Produttori
LAMP S. PROSPERO S.p.A.
Via della Pace, 25/A
41030 S. Prospero (Mo)
Italia

LA.FA.RE. S.r.l.
Via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77
80056 Ercolano (NA)
Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato a

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 08/09/2017
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 08/09/2017

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).