

## **Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

### **Neo Formitrol senza zucchero 1 mg compresse orosolubili**

Cetilpiridinio cloruro

#### **Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è Neo Formitrol senza zucchero e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Neo Formitrol senza zucchero
3. Come prendere Neo Formitrol senza zucchero
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Neo Formitrol senza zucchero
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è Neo Formitrol senza zucchero e a cosa serve**

Neo Formitrol senza zucchero contiene il principio attivo cetilpiridinio cloruro che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici che impediscono o bloccano la crescita dei batteri.

Questo medicinale è indicato come disinfettante della mucosa della bocca e della gola.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Neo Formitrol senza zucchero**

##### **Non prenda Neo Formitrol senza zucchero:**

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se la persona che deve prendere questo medicinale è un bambino al di sotto dei 12 anni e predisposti a convulsioni e a problemi di respirazione. (Vedere il paragrafo "Uso nei bambini").

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Neo Formitrol senza zucchero.

Questo medicinale è solo per uso locale.

Non prenda questo medicinale per molto tempo ed informi il medico se non nota un miglioramento dei sintomi.

Se assume Neo Formitrol senza zucchero per periodi di tempo prolungati, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione). In questo caso, sospenda il trattamento e consulti il medico che stabilirà la terapia più adatta a lei.

### **Altri medicinali e Neo Formitrol senza zucchero**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Se sta assumendo Neo Formitrol senza zucchero, non usi altri medicinali antisettici o detergenti della bocca e della gola (cavo orale).

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Se è in stato di gravidanza o sta allattando al seno, prenda questo medicinale solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

### **Neo Formitrol senza zucchero contiene sorbitolo**

Questo medicinale contiene 1.137,50 mg di sorbitolo per compressa.

Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei (o il bambino) è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima che lei (o il bambino) prenda questo medicinale.

## **3. Come prendere Neo Formitrol senza zucchero**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 compressa, fino ad un massimo di 8 compresse al giorno, in base alle necessità.

Lasci trascorrere almeno 2 ore prima di assumere un'altra compressa di Neo Formitrol senza zucchero.

Sciolga le compresse lentamente in bocca.

Non superi le dosi giornaliere consigliate.

### **Uso nei bambini**

Neo Formitrol senza zucchero non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni, salvo diversa prescrizione medica.

Neo Formitrol senza zucchero, per il suo contenuto in mentolo, è controindicato nei bambini predisposti a convulsioni e a problemi di respirazione (laringospasmo).

### **Se prende più Neo Formitrol senza zucchero di quanto deve**

In seguito all'assunzione di una dose eccessiva di questo medicinale si possono manifestare i seguenti sintomi: nausea, vomito, difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle (cianosi), sensazione di soffocamento (asfissia), dovuta alla paralisi dei muscoli respiratori, riduzione dell'attività del cervello (depressione del sistema nervoso centrale), abbassamento della pressione (ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma).

Il medico stabilirà la terapia più adatta a lei, in base alla gravità dei sintomi.

In caso di ingestione/assunzione di una quantità eccessiva di questo medicinale, interrompa il trattamento e si rivolga immediatamente al medico o al pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

### **Se dimentica di prendere Neo Formitrol senza zucchero**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- irritazione temporanea delle gengive;
- nausea, vomito e dolore all'addome;
- infiammazione della bocca (stomatite);
- alterazione del gusto;
- lieve cambiamento del colore dei denti;
- irritazione della pelle (dermatite allergica);
- bruciore o irritazione della bocca.

## **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Neo Formitrol senza zucchero**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad."

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale, al riparo da fonti di calore.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Neo Formitrol senza zucchero**

- Il principio attivo è: cetilpiridinio cloruro. Ogni compressa contiene 1 mg di cetilpiridinio cloruro.
- Gli altri componenti sono: saccarina, aroma menta, mentolo, paraffina liquida, polivinilpirrolidone, polivinilpirrolidone vinilacetato, talco, sorbitolo.

### **Descrizione dell'aspetto di Neo Formitrol senza zucchero e contenuto della confezione**

Blister PVC/AL contenente 20 compresse orosolubili.

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

Sandoz S.p.A.- Largo U. Boccioni 1 - Origgio (VA) - Italia

### **Produttore**

Mipharm S.p.A. - Via Quaranta 12 - Milano - Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**