Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

FARVICETT 1,5%+15% concentrato per soluzione cutanea
Clorexidina gluconato e cetrimide

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o all'infermiere.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos'è FARVICETT e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FARVICETT
3. Come usare FARVICETT
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FARVICETT
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è FARVICETT e a che cosa serve

FARVICETT contiene due principi attivi, la clorexidina gluconato e la cetrimide, che appartengono ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che uccidono, riducono o bloccano la crescita dei microrganismi.

FARVICETT è indicato per pulire e disinfettare:
- la pelle, anche se sono presenti lesioni (ferite, ustioni);
- i genitali esterni in ostetricia, ginecologia ed urologia.

2. Cosa deve sapere prima di usare FARVICETT

Non usi FARVICETT
- se è allergico alla clorexidina, alla cetrimide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- per disinfettare le cavità mucose del corpo, ad esempio per effettuare lavaggi e irrigazioni.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o all'infermiere prima di usare FARVICETT.

Questo medicinale deve essere applicato solo sulla pelle (uso esterno).

FARVICETT non deve essere ingerito, in quanto si possono verificare gravi conseguenze, anche mortali.

Eviti di applicare FARVICETT sotto un bendaggio non traspirante (occlusivo).

Non applichi questo medicinale sugli occhi o sull'orecchio.
Inoltre, si raccomanda di evitare il contatto con il cervello o con le membrane che rivestono il cervello (meningi).

Dopo aver applicato questo medicinale sulla pelle, si raccomanda di non esporsi al sole.

Non usi questo medicinale per trattamenti prolungati.
FARVICETT, soprattutto se utilizzato per lunghi periodi di tempo, può provocare reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione). In tal caso, è necessario interrompere il trattamento.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. FARVICETT può provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e FARVICETT
Informi il medico o l'infermiere se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con FARVICETT, si raccomanda di evitare di usare altri antisettici e/o detergenti).

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o all'infermiere prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera la capacità di guidare o di usare macchinari.

3. Come usare FARVICETT

Questo medicinale sarà utilizzato solo da un medico o da personale specializzato.

Il medicinale deve essere usato solo diluito in acqua, come segue:
- **pulizia ed antisepsi esterna in ginecologia, ostetricia ed urologia:** 1 busta o 20 ml di soluzione in 2 litri di acqua;
- **disinfezione della cute integra:** 1 busta o 20 ml di soluzione in 500 ml d'acqua;
- **disinfezione e pulizia di ferite ed ustioni:** 1 busta o 20 ml di soluzione in 1 litro d'acqua.

Dopo opportuna diluzione, tamponare la pelle con cotone abbondantemente imbevuto di medicinale.

Non superare le dosi consigliate.

Se necessario, ripetere l'operazione per un massimo di 4 -5 volte al giorno.

Se usa più FARVICETT di quanto deve
Se non vengono superate le dosi consigliate, non c'è rischio di sovradosaggio.
L'ingestione accidentale di questo medicinale può causare sintomi quali: nausea, vomito, difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle dovuta a carenza di ossigeno (cianosi), soffocamento (asfissia) dovuto al blocco dei muscoli respiratori, abbassamento della pressione del sangue (ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma).

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

- bruciore o irritazione della pelle (intolleranza). Questi effetti in genere non richiedono modifiche del trattamento;
- reazioni allergiche (casi di idiosincrasia);

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):
- bruciature (ustioni chimiche) nei neonati.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare FARVICETT

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene FARVICETT
- I principi attivi sono clorexidina gluconato e cetrimide. 100 g di soluzione contengono 1,5 g di clorexidina gluconato e 15 g di cetrimide.
- Gli altri componenti sono: salicilato di metile, alcool isopropilico, essenza di limone, giallo tramonto (E110), acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di FARVICETT e contenuto della confezione
Confezioni da 12 flaconi da 1 litro e da 400 buste da 20 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore
Nuova Farmec S.r.l. – Via W. Flemming, 7 – Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

FARVICETT 0,015%+0,15% soluzione cutanea
Clorexidina gluconato e cetrimide

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos'è FARVICETT e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FARVICETT
3. Come usare FARVICETT
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FARVICETT
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è FARVICETT e a che cosa serve

FARVICETT contiene due principi attivi, la clorexidina gluconato e la cetrimide, che appartengono ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che uccidono, riducono o bloccano la crescita dei microrganismi.

FARVICETT è indicato per pulire e disinfettare:
- la pelle, anche se sono presenti lesioni (ferite, ustioni);
- i genitali esterni in ostetricia, ginecologia ed urologia.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare FARVICETT

Non usi FARVICETT
- se è allergico alla clorexidina, alla cetrimide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- per disinfettare le cavità mucose del corpo, ad esempio per effettuare lavaggi e irrigazioni.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare FARVICETT.

Questo medicinale deve essere applicato solo sulla pelle (uso esterno).

FARVICETT non deve essere ingerito, in quanto si possono verificare gravi conseguenze, anche mortali.

Eviti di applicare FARVICETT sotto un bendaggio non traspirante (occlusivo).

Non applichi questo medicinale sugli occhi o sull'orecchio.
Inoltre, si raccomanda di evitare il contatto con il cervello o con le membrane che rivestono il cervello (meningi).

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Dopo aver applicato questo medicinale sulla pelle, si raccomanda di non esporsi al sole.

Non usi questo medicinale per trattamenti prolungati.
FARVICETT, soprattutto se utilizzato per lunghi periodi di tempo, può provocare reazioni allergiche (fenomeni di ipersensibilità). In tal caso, è necessario interrompere il trattamento.

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. FARVICETT può provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e FARVICETT
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con FARVICETT, si raccomanda di evitare di usare altri antisettici e/o detergenti.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera la capacità di guidare o di usare macchinari.

3. Come usare FARVICETT

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Il medicinale può essere usato su pelle lesa e pelle integra.
Tamponi la pelle con cotone abbondantemente imbevuto di medicinale.

Se necessario, ripeta l'operazione per un massimo di 4 -5 volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate.

Se usa più FARVICETT di quanto deve
Se non vengono superate le dosi consigliate, non c'è rischio di sovradosaggio.
L'ingestione accidentale di questo medicinale può causare sintomi quali: nausea, vomito, difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle dovuta a carenza di ossigeno (cianosi), soffocamento (asfissia) dovuto al blocco dei muscoli respiratori, abbassamento della pressione del sangue (ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma).
In caso di ingestione accidentale del medicinale contatti subito il medico o si rechi al pronto soccorso del più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:
- bruciore o irritazione della pelle (intolleranza). Questi effetti in genere non richiedono modifiche del trattamento;

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- reazioni allergiche (casi di idiosincrasia);

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
- bruciature (ustioni chimiche) nei neonati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare FARVICETT

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene FARVICETT
- I principi attivi sono clorexidina gluconato e cetrimide. 100 g di soluzione contengono 0,015 g di clorexidina gluconato e 0,150 g di cetrimide.
- Gli altri componenti sono: alcool etilico 95°, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di FARVICETT e contenuto della confezione
Soluzione cutanea.
Confezione da 10 buste da 25 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore
Nuova Farmec S.r.l. – Via W. Flemming, 7 – Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

FARVICETT 0,015%+0,15% soluzione cutanea
Clorexidina gluconato e cetrimide

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o all'infermiere.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos'è FARVICETT e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FARVICETT
3. Come usare FARVICETT
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FARVICETT
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è FARVICETT e a che cosa serve

FARVICETT contiene due principi attivi, la clorexidina gluconato e la cetrimide, che appartengono ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che uccidono, riducono o bloccano la crescita dei microrganismi.

FARVICETT è indicato per pulire e disinfettare:
- la pelle, anche se sono presenti lesioni (ferite, ustioni);
- i genitali esterni in ostetricia, ginecologia ed urologia.

2. Cosa deve sapere prima di usare FARVICETT

Non usi FARVICETT
- se è allergico alla clorexidina, alla cetrimide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- per disinfettare le cavità mucose del corpo, ad esempio per effettuare lavaggi e irrigazioni.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o all'infermiere prima di usare FARVICETT.

Questo medicinale deve essere applicato solo sulla pelle (uso esterno).

FARVICETT non deve essere ingerito, in quanto si possono verificare gravi conseguenze, anche mortali.

Eviti di applicare FARVICETT sotto un bendaggio non traspirante (occlusivo).

Non applichi questo medicinale sugli occhi o sull'orecchio.
Inoltre, si raccomanda di evitare il contatto con il cervello o con le membrane che rivestono il cervello (meningi).

Dopo aver applicato questo medicinale sulla pelle, si raccomanda di non esporsi al sole.

Non usi questo medicinale per trattamenti prolungati.
FARVICETT, soprattutto se utilizzato per lunghi periodi di tempo, può provocare reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione). In tal caso, è necessario interrompere il trattamento.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. FARVICETT può provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e FARVICETT
Informi il medico o l'infermiere se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con FARVICETT, si raccomanda di evitare di usare altri antisettici e/o detergenti).

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o all'infermiere prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera la capacità di guidare o di usare macchinari.

3. Come usare FARVICETT

Questo medicinale sarà utilizzato solo da un medico o da personale specializzato.

Il medicinale può essere usato su pelle lesa e pelle integra.
Tamponi la pelle con cotone abbondantemente imbevuto di medicinale.

Se necessario, ripeta l'operazione per un massimo di 4 -5 volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate.

Se usa più FARVICETT di quanto deve
Se non vengono superate le dosi consigliate, non c'è rischio di sovradosaggio.
L'ingestione accidentale di questo medicinale può causare sintomi quali: nausea, vomito, difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle dovuta a carenza di ossigeno (cianosi), soffocamento (asfissia) dovuto al blocco dei muscoli respiratori, abbassamento della pressione del sangue (ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma).

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:
- bruciore o irritazione della pelle (intolleranza). Questi effetti in genere non richiedono modifiche del trattamento;
- reazioni allergiche (casi di idiosincrasia);

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
- bruciature (ustioni chimiche) nei neonati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare FARVICETT

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene FARVICETT
- I principi attivi sono clorexidina gluconato e cetrimide. 100 g di soluzione contengono 0,015 g di clorexidina gluconato e 0,150 g di cetrimide.
- Gli altri componenti sono: alcool etilico 95°, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di FARVICETT e contenuto della confezione
Confezione da 400 buste da 25 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore
Nuova Farmec S.r.l. – Via W. Flemming, 7 – Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).