PRIMA DELL'USO
LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- **per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista**
- **consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento**

ENDOLAC

10.000.000 UFC
5.000.000 UFC
4.000.000.000 UFC

Polvere per sospensione orale
10 Bustine

Lactobacillus acidophilus P-18806
Lactobacillus delbrueckii P-18805
Streptococcus thermophilus P-18807

Che cosa è
Endolac è costituito da microorganismi antidiarroici (fermenti lattici).

Perché si usa
Endolac si usa nelle sindromi dismicrobiche intestinali, ossia nelle sindromi diarroiche da alterata flora batterica (diarrea, enteriti aspecifiche, coliti); dismicrobismo intestinale da antibiotici.

Quando non deve essere usato
Endolac non deve mai essere usato nei casi di ipersensibilità verso i componenti del prodotto o ad uno qualsiasi degli eccipienti o alle altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Ipersensibilità accertata ad uno dei costituenti del latte. (vedere anche il paragrafo "E' importante sapere che").

Precauzioni per l'uso
I batteri contenuti in ENDOLAC sono sensibili ai principali antibiotici. Per questo ENDOLAC deve essere assunto almeno 3 ore dopo la somministrazione di antibiotici.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 20/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica
Non sono note interazioni con altri farmaci.

E' importante sapere che

Endolac può essere utilizzato dagli individui intolleranti al lattosio mentre i pazienti con un'accertata allergia ad uno dei componenti del latte non dovrebbero utilizzare prodotti a base di batteri lattici.
In ragione della bassa quantità di lattosio contenuta nel prodotto e della sua associazione con batteri capaci di metabolizzarlo, l'utilizzo del prodotto da parte di individui intolleranti al lattosio, non dovrebbe comportare la comparsa di sintomi legati all'intolleranza al lattosio.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale
Non esistono particolari limitazioni all'uso di ENDOLAC durante la gravidanza e l'allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

ENDOLAC non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari

Informazioni importanti su alcuni eccipienti

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Come usare questo medicinale

Quanto

Adulti: 1 – 2 bustine al dì
Attenzione: non superare le dosi indicate.

Non ci sono dati disponibili sui bambini.

Quando e per quanto tempo

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento
Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche

Come

Le bustine possono essere somministrate con un poco d'acqua oppure il loro contenuto può essere versato in una piccola quantità di acqua zuccherata o latte.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio del prodotto.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di ENDOLAC avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale

Effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, ENDOLAC può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 20/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Non sono riportati in letteratura segnalazioni di effetti indesiderati.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili". La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale

Come conservare ENDOLAC

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo Scad:. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non usi questo medicinale se nota segni visibili di deterioramento.
Conservazione: conservare il prodotto a temperatura compresa tra +2 ° e + 8 °C
L'occasionale e breve permanenza a temperatura ambiente non compromette in modo significativo l'attività del prodotto.
Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ENDOLAC

Ogni bustina contiene:
Principio attivo:

Lactobacillus acidophilus P-18806	almeno 1 x 10^7 UFC/bustina
Lactobacillus delbrueckii P-18805	almeno 5 x 10^6 UFC/bustina
Streptococcus thermophilus P-18807	almeno 4 x 10^9 UFC/bustina

Eccipienti:
Acido silicico - Sodio saccarinato - Aroma banana polvere - Aroma albicocca polvere - Maltodestrine – crioprotettore (Latte scremato – Saccarosio – Sorbitolo – Sodio ascorbato – Tween 80) – Lattosio non più di 270 mg

Descrizione dell'aspetto di ENDOLAC e contenuto della confezione

Polvere per sospensione orale; confezione da 10 bustine.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
PROGE FARM S.r.l. – Largo Donegani, 4/A – 28100 Novara

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 20/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

PRODUTTORE S.I.I.T. S.r.l. - Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti - Via Ariosto, 50/60 - Trezzano sul Naviglio (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il <{MM/AAAA}> <{mese AAAA}

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 20/04/2021

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).