

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

### MASTER-AID Disinfettante 1g/100ml soluzione cutanea Clorexidina digluconato

#### **Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante
3. Come usare MASTER-AID Disinfettante
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve**

MASTER-AID Disinfettante contiene il principio attivo clorexidina digluconato che appartiene alla categoria delle biguanidi ed è un disinfettante per uso topico (locale) dermatologico (cutaneo).

Esso agisce sulla membrana della cellula batterica causandone la rottura.

MASTER-AID Disinfettante è utilizzato per la disinfezione e la pulizia della pelle in presenza di ferite e bruciature superficiali e piaghe da decubito (lesioni della pelle che interessano le parti del corpo sottoposte a pressione per periodi prolungati) di lieve entità.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante**

##### **Non usi MASTER-AID Disinfettante**

- se è allergico alla clorexidina digluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MASTER-AID Disinfettante.

Non usare MASTER-AID Disinfettante per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Non esporre la parte trattata alla luce diretta del sole dopo l'applicazione del prodotto. Il prodotto non deve essere posto in contatto con il cervello, le meningi (membrane che rivestono il sistema nervoso centrale) e l'orecchio medio (parte dell'orecchio compreso tra l'orecchio esterno e quello interno) né penetrare dentro il condotto uditivo in caso di perforazione timpanica.

Il prodotto è solo per uso esterno; l'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un'idonea terapia.

### **Bambini**

MASTER-AID Disinfettante può provocare ustioni chimiche specialmente nei neonati.

### **Altri medicinali e MASTER-AID Disinfettante**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici (antibatterici) e detergenti.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

MASTER-AID Disinfettante può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non influisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

### **Informazioni importanti su alcuni eccipienti**

MASTER-AID Disinfettante contiene l'aroma agrumi a sua volta contenente citrale, citronellolo, cumarina, farnesolo, geraniolo, limonene, linalolo.

Citrone, citronellolo, cumarina, farnesolo, geraniolo, limonene, linalolo possono causare reazioni allergiche.

## **3. Come usare MASTER-AID Disinfettante**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulta il medico o il farmacista.

Applicare 2-3 volte al giorno sulla parte interessata una quantità di soluzione adeguata all'estensione della lesione.

Non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Usare solo per brevi periodi di trattamento.

### **Se usa più MASTER-AID Disinfettante di quanto deve**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di MASTER-AID Disinfettante avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Nei confronti della clorexidina è stato riportato qualche raro caso di idiosincrasia (intolleranza).

### **Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini**

Ustioni chimiche (frequenza non nota).

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce ed in un luogo fresco.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene MASTER-AID Disinfettante**

- Il principio attivo è la clorexidina digluconato. 100 ml di soluzione contengono 1 g di clorexidina digluconato.
- Gli altri componenti sono agrumi essenza, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di MASTER-AID Disinfettante e contenuto della confezione**

MASTER-AID Disinfettante si presenta in forma di soluzione cutanea.

Il contenuto del flacone è di 50 ml.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Pietrasanta Pharma S.p.A.  
Via di Caprino, 7  
55012 Capannori (LU)

### **Produttore**

BELTAPHARM S.p.A.  
Via Stelvio, 66  
20095 Cusano Milanino (MI)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

### MASTER-AID Disinfettante 1g/100ml soluzione cutanea Clorexidina digluconato

#### **Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante
3. Come usare MASTER-AID Disinfettante
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve**

MASTER-AID Disinfettante contiene il principio attivo clorexidina digluconato che appartiene alla categoria delle biguanidi ed è un disinfettante per uso topico (locale) dermatologico (cutaneo).  
Esso agisce sulla membrana della cellula batterica causandone la rottura.

MASTER-AID Disinfettante è utilizzato per la disinfezione e la pulizia della pelle in presenza di ferite e bruciature superficiali e piaghe da decubito (lesioni della pelle che interessano le parti del corpo sottoposte a pressione per periodi prolungati) di lieve entità.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante**

##### **Non usi MASTER-AID Disinfettante**

- se è allergico alla clorexidina digluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MASTER-AID Disinfettante.

Non usare MASTER-AID Disinfettante per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Non esporre la parte trattata alla luce diretta del sole dopo l'applicazione del prodotto. Il prodotto non deve essere posto in contatto con il cervello, le meningi (membrane che rivestono il sistema nervoso centrale) e l'orecchio medio (parte

dell'orecchio compreso tra l'orecchio esterno e quello interno) né penetrare dentro il condotto uditivo in caso di perforazione timpanica.

Il prodotto è solo per uso esterno; l'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un'adeguata terapia.

### **Bambini**

MASTER-AID Disinfettante può provocare ustioni chimiche, specialmente nei neonati.

### **Altri medicinali e MASTER-AID Disinfettante**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici (antibatterici) e detergenti.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

MASTER-AID Disinfettante può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non influisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

### **Informazioni importanti su alcuni eccipienti**

MASTER-AID Disinfettante contiene l'aroma agrumi a sua volta contenente citrale, citronellolo, cumarina, farnesolo, geraniolo, limonene, linalolo.

Citrale, citronellolo, cumarina, farnesolo, geraniolo, limonene, linalolo possono causare reazioni allergiche.

## **3. Come usare MASTER-AID Disinfettante**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulta il medico o il farmacista.

Applicare 2-3 volte al giorno sulla parte interessata una quantità di soluzione adeguata all'estensione della lesione

Non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Usare solo per brevi periodi di trattamento.

### **Se usa più MASTER-AID Disinfettante di quanto deve**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di MASTER-AID Disinfettante avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Nei confronti della clorexidina è stato riportato qualche raro caso di idiosincrasia (intolleranza).

### **Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini**

Ustioni chimiche.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce ed in un luogo fresco.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene MASTER-AID Disinfettante**

- Il principio attivo è la clorexidina digluconato. 100 ml di soluzione contengono 1 g di clorexidina digluconato.
- Gli altri componenti sono agrumi essenza, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di MASTER-AID Disinfettante e contenuto della confezione**

MASTER-AID Disinfettante si presenta in forma di soluzione cutanea.

Il contenuto del flacone è di 250 ml.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Pietrasanta Pharma S.p.A.

Via di Caprino, 7

55012 Capannori (LU)

### **Produttore**

BELTAPHARM S.p.A.

Via Stelvio, 66

20095 Cusano Milanino (MI)

ZETA FARMACEUTICI S.p.A.  
Via Galvani, 10  
36066 Sandrigo (VI)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

Agenzia Italiana del Farmaco