

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente
KERAFILMVER
16,7% + 16,7% collodio

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Kerofilmver e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Kerofilmver
3. Come usare Kerofilmver
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Kerofilmver
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Kerofilmver e a cosa serve

Kerofilmver contiene i principi attivi acido salicilico e acido lattico e appartiene ad una categoria di farmaci detti cheratolitici (sostanze capaci di sciogliere lo strato superficiale della pelle).

Kerofilmver è indicato per il trattamento locale:

- delle verruche,
- degli ispessimenti della pelle, come calli e duroni (ipercheratosi).

2. Cosa deve sapere prima di usare Kerofilmver

NON usi Kerofilmver

- se è allergico all'acido salicilico e/o all'acido lattico o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6),
- nei bambini sotto i due anni di età,
- sul viso, sulla zona ano-genitale e su aree di grandi dimensioni,

- sui nei (nevi), sulle escrescenze scure della pelle e in rilievo (verruche seborroiche), sui condilomi, sulle verruche del viso, sui calli infetti,
- sulle ferite (pelle lesa).

Se ha il diabete o problemi circolatori usi Kerofilmver solo sotto controllo medico.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Kerofilmver.

L'impiego, specie se prolungato, di prodotti per uso locale può dare origine a reazioni allergiche (sensibilizzazione). In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico per iniziare una terapia idonea.

Consulti immediatamente il medico o si rechi al più vicino ospedale in caso di ingestione accidentale del prodotto. I farmaci come Kerofilmver, contenenti acido salicilico ed acido lattico ad elevata concentrazione, se ingeriti, possono provocare conseguenze gravi, talvolta fatali.

Applichi Kerofilmver solo su verruche, calli e duri, senza sconfinare sulla pelle sana circostante proteggendola durante l'applicazione.

Eviti il contatto con gli occhi e con le mucose. Se incidentalmente il prodotto venisse a contatto con mucose o con gli occhi:

- sciacqui subito e abbondantemente con acqua,
- rimuova la pellicola di collodio che si forma,
- continui a sciacquare con acqua per almeno un quarto d'ora.

Non deve:

- ingerire il prodotto,
- impiegare questo prodotto per prevenire la formazione delle verruche,
- usare questo prodotto per trattamenti prolungati. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consulti il medico,
- superare le dosi consigliate.

Bambini

Non somministri Kerofilmver a bambini sotto i 2 anni di età.

Nei bambini tra i 2 e i 12 anni di età il prodotto deve essere somministrato solo in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo medico.

Altri medicinali e Kerofilmver

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente

assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti l'uso contemporaneo di:

- altri cheratolitici (sostanze capaci di sciogliere lo strato superficiale della pelle) perché potrebbe aumentare l'azione caustica (capace di distruggere i tessuti) delle sostanze attive.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Usi Kerofilmver solo in caso di effettiva necessità e sotto il controllo del medico perché la sicurezza d'uso in gravidanza non è accertata.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Kerofilmver non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

3. Come usare Kerofilmver

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è un'applicazione al mattino e alla sera o secondo la prescrizione del medico.

Applichi la soluzione sulla parte da trattare con la spatola applicatore, evitando che il liquido venga a contatto con la pelle sana.

Se usa più Kerofilmver di quanto deve

Kerofilmver, se applicato con abbondanza o in dose eccessiva, può talora provocare una leggera sensazione di bruciore.

Contatti il medico se il bruciore fosse intenso o continuo.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Kerofilmver avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

In caso di intolleranza è possibile che si verifichi:

- bruciore o irritazione, che non richiedono la modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Kerofilmver

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
Prodotto altamente infiammabile: conservare al riparo da fiamme e fonti di calore.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad.. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Tenere il flacone ben chiuso.

Un notevole aumento di densità del prodotto indica che il flacone non è stato chiuso correttamente e che il solvente in esso contenuto è parzialmente evaporato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Kerofilmver

- I principi attivi sono acido salicilico e acido lattico. 100 g di collodio contengono 16,7 g di acido salicilico e 16,7 g di acido lattico.
- Gli altri componenti sono: pirossilina; alcol etilico; etere etilico.

Descrizione dell'aspetto di Kerofilmver e contenuto della confezione

Flacone da 10 ml di collodio con spatola applicatore.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

PIERRE FABRE ITALIA S.p.A.
Via G.G. Winckelmann, 1
20146 MILANO

Produttore

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION - Z.I. - 45220 CHATEAURENARD -
FRANCIA

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco