

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

BRUNICROM 2% collirio, soluzione

Sodio cromoglicato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Brunicrom e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Brunicrom
3. Come usare Brunicrom
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Brunicrom
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è BRUNICROM e a che cosa serve

Brunicrom contiene il principio attivo sodio cromoglicato che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antiallergici che attenuano i sintomi delle allergie.

Questo medicinale è indicato per prevenire le reazioni allergiche degli occhi come la congiuntivite allergica e la cheratocongiuntivite primaverile.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Brunicrom

Non usi Brunicrom:

- se è allergico al sodio cromoglicato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Brunicrom.

Questo medicinale è disponibile in contenitori monodose sterili che non contengono conservanti, pertanto può essere usato anche da persone che portano lenti a contatto.

Eviti di toccare l'occhio con il beccuccio del contenitore.

Elimini il contenitore dopo l'uso

Altri medicinali e Brunicrom

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali.

Se utilizza un altro collirio, lasci trascorrere almeno 15 minuti tra l'applicazione di Brunicrom e dell'altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Non usi questo medicinale durante il primo trimestre di gravidanza, tranne in caso di assoluta necessità.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti effetti di questo medicinale sulla capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

3. Come usare Brunicrom

Usi Brunicrom seguendo sempre esattamente le istruzioni contenute in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1-2 gocce, da introdurre nell'occhio (sacca congiuntivale inferiore), 4 volte al giorno. Eviti di toccare l'occhio con il beccuccio del contenitore.

Per un uso corretto del medicinale, segua attentamente le istruzioni:

- stacchi un flaconcino monodose dalla striscia (Figura A);
- scuota il beccuccio per liberarlo dal liquido;
- apra il flaconcino monodose, ruotando l'aletta e contemporaneamente tirando (Figura B);
- capovolga il flaconcino ed eserciti una leggera pressione sullo stesso, in modo da far uscire il medicinale goccia a goccia;
- elimini il contenitore monodose dopo l'uso.




Figura A




Figura B

Ogni contenitore contiene una quantità di collirio sufficiente per trattare entrambi gli occhi 1 sola volta.

Quando possibile, il trattamento con questo medicinale deve essere iniziato prima che si manifesti la reazione allergica e deve essere continuato con regolarità fino a che lei è in contatto con la sostanza che le provoca allergia o comunque fino alla scomparsa dei sintomi.

Se usa più Brunicrom di quanto deve

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Brunicrom avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Brunicrom

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- bruciore e prurito transitori degli occhi.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Brunicrom

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non conservare a temperature superiore a 25°C.

Conservare nel contenitore originale e al riparo dalla luce del sole.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Brunicrom

- Il principio attivo è sodio cromoglicato. 100 ml di soluzione contengono 2 g di sodio cromoglicato.
- Gli altri componenti sono: sodio cloruro (isotonizzante), acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Brunicrom e contenuto della confezione

20 contenitori monodose da 0,3 ml in bustine termosaldate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Bruschettini S.r.l. - Via Isonzo, 6 - 16147 Genova – Italia

Produttore

Laboratoire Unither – Espace Industriel Nord - 151, rue André Durouchez - CS28028 80084 AMIENS
CEDEX 02 - FRANCIA

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: