Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

FARMASEPT 0,175% soluzione cutanea
Didecildimetilammonio cloruro

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o all'infermiere.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:
1. Cos'è FARMASEPT e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FARMASEPT
3. Come usare FARMASEPT
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FARMASEPT
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è FARMASEPT e a cosa serve

FARMASEPT contiene il principio attivo didecildimetilammonio cloruro che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che riducono o bloccano la crescita dei batteri.

FARMASEPT è indicato per pulire e disinfettare:
- la pelle, sia integra che in presenza di ferite superficiali di piccole dimensioni;
- le mani;
- il campo operatorio prima di un intervento chirurgico.

2. Cosa deve sapere prima di usare FARMASEPT

Non usi FARMASEPT:
- se è allergico al didecildimetilammonio cloruro o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o all'infermiere prima di usare FARMASEPT.

Questo medicinale deve essere applicato solo sulla pelle (uso esterno).
Non applichi FARMASEPT sugli occhi.
FARMASEPT non deve essere ingerito né inalato in quanto si possono verificare gravi conseguenze, anche mortali.

Dopo aver applicato questo medicinale sulla pelle, si raccomanda di non esporsi al sole o a lampade solari (sorgenti artificiali di raggi ultravioletti).

Non usi questo medicinale per trattamenti prolungati.

FARMASEPT, soprattutto se utilizzato per lunghi periodi di tempo, può provocare reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione). In tal caso, è necessario interrompere il trattamento.

Altri medicinali e FARMASEPT
Informi il medico o l'infermiere se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con FARMASEPT, si raccomanda di evitare di usare altri medicinali simili (disinfettanti o detergenti).

Documento reso disponibile da AIFA il 22/04/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

FARMASEPT contiene etanolo
Questo medicinale contiene 4,88 mg di alcol (etanolo) in 100 ml di soluzione, che equivale a 4,88% p/v. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

FARMASEPT contiene essenza a base di bergamotto a sua volta contenente geraniolo, citrale, limonene, linalolo.
Geraniolo, citrale, limonene e linalolo possono causare reazioni allergiche.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico prima di usare questo medicinale.

Può usare questo medicinale se è in stato di gravidanza e se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera la capacità di guidare o di usare macchinari.

3. Come usare FARMASEPT

Questo medicinale deve essere usato solo da un medico o da personale specializzato. Applichi il medicinale sulla zona interessata e su quella circostante, utilizzando un po' di cotone o una garza, 2-3 volte al giorno.

Per disinfettare le mani, lavi ripetutamente con 5-6 ml di medicinale per almeno 1 minuto.

Non superare le dosi consigliate.

Se usa più FARMASEPT di quanto deve
Se non supera le dosi consigliate, non c'è rischio di sovradosaggio.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di questo medicinale, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.
L'ingestione accidentale di questo medicinale può provocare nausea e vomito. In caso di ingestione di elevate quantità di FARMASEPT si possono manifestare sintomi quali: difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle (cianosi), sensazione di soffocamento (asfissia), dovuti all'arresto dei muscoli respiratori, riduzione dell'attività del cervello (depressione del sistema nervoso centrale), abbassamento della pressione del sangue (ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma) e morte.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare bruciore o irritazione della pelle (intolleranza).

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare FARMASEPT

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Documento reso disponibile da AIFA il 22/04/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo “Scadenza”. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere il prodotto dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene FARMASEPT
- Il principio attivo è il didecildimetilammonio cloruro. 100 g di soluzione contengono 0, 175 g di didecildimetilammonio cloruro. Gli altri componenti sono: etanolo 96%, essenza di bergamene (contiene geraniolo, citrale, limonene, linalolo), acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di FARMASEPT e contenuto della confezione
Confezione da 12 flaconi da 1 litro.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Nuova Farmec S.r.l. – Via W. Flemming, 7 – Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 22/04/2022
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).