METILE SALICILATO
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
20% UNGUENTO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO
Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

Denominazione del Medicinale
METILE SALICILATO AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 20% unguento

Composizione
100 g di unguento contengono:
Principio attivo:
Metile salicilato 20 g (un tubo da 28 grammi contiene metile salicilato 5,60 g).
Eccipienti: **Lanolina**, vaselina bianca, mentolo racemico.

Come si presenta
METILE SALICILATO 20% Unguento si presenta in forma di unguento per uso cutaneo.
Il contenuto della confezione è 28 g.

Che cosa è
METILE SALICILATO 20% Unguento è un farmaco per uso topico derivato dall'acido acetilsalicilico per dolori articolari e muscolari.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Agenzia Industrie Difesa- Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare
Via XX Settembre, 123/A - Roma

Produttore e controllore finale
Agenzia Industrie Difesa- Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare
Via Reginaldo Giuliani, 201 – 50141 Firenze.
e
Mastelli Srl
Via Bussana Vecchia, 32
Sanremo (IM).

Perché si usa
METILE SALICILATO 20 % unguento si usa per il trattamento a breve termine degli stati dolorifici di origine muscolare ed articolare (contusioni, distorsioni, strappi muscolari, lombalgie).

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 25/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Quando non deve essere usato
Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; in particolare verso i salicilati.
Poiché il prodotto contiene mentolo, ed in assenza di dati clinici disponibili, esso non deve essere usato in età pediatrica.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico
- In gravidanza (vedere Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento);
- Quando si stanno usando altri medicinali.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento
In gravidanza e durante l'allattamento METILE SALICILATO 20 % unguento deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.
Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

Precauzioni per l'uso
Il prodotto non deve essere applicato su zone di pelle sensibili, irritate o con soluzioni di continuità (ferite, abrasioni), né sulle mucose.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

È importante sapere che
L'uso, specie se prolungato, del prodotto può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico.
METILE SALICILATO 20% unguento contiene lanolina, che può causare localmente reazioni cutanee (per esempio, dermatite da contatto).

Come usare questo medicinale
Quanto
Due o tre frizioni al giorno, massaggiando la parte dolente con circa 3-5 g di prodotto (1-2 cm di unguento).
Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico. Non usare nelle 24 ore una quantità di unguento superiore ai 20 grammi.

Quando e per quanto tempo
Se la sintomatologia dolorosa persiste dopo un breve periodo di trattamento (3-5 giorni), interrompere il trattamento e consultare il medico.
Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di METILE SALICILATO 20% unguento avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale portando con voi la confezione del medicinale.

Cosa fare se avete dimenticato di prendere una o più dosi
Non aumentare le dosi successive in caso di dimenticanza di una applicazione.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 25/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Effetti indesiderati
Sono possibili dermatiti da contatto, fenomeni irritativi, eruzioni cutanee su base allergica.
Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo. Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.
È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del Foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:
DICEMBRE 2008

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 25/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).