

PRIMA DELL'USO

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA

1% CREMA

CHE COS'È

CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA è un antimicotico (antifungino) per uso dermatologico, agisce cioè localmente eliminando i funghi della pelle.

PERCHÉ SI USA

CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA si usa per il trattamento delle micosi (funghi) della pelle e delle pieghe cutanee, come pitiriasi versicolore, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO

Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire.

Nelle dermatiti da pannolino, si sconsiglia l'impiego di pannolini ad effetto occlusorio dopo l'applicazione del farmaco.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Non sono noti medicinali o alimenti che possano modificare l'effetto del medicinale.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione con manifestazioni eritematose (rossore localizzato) e prurito.

In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.

In caso di recidive consultare il medico.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Primo trimestre di gravidanza (vedere "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento").

E' opportuno consultare il medico anche nel caso in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato (recidive di micosi).

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Nel primo trimestre di gravidanza CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti

CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA crema contiene alcool cetostearilico che può causare reazioni cutanee locali (es : dermatite da contatto).

Note di educazione sanitaria

Per prevenire le micosi e le sue recidive è utile seguir alcune norme di carattere igienico-sanitario, quali:

- Nei luoghi pubblici come piscine, palestre, camere d'albergo, etc evitare di camminare a piedi nudi.
- Per chi pratica sport è importante utilizzare calzature traspiranti e comode, le cui solette plantari dovrebbero essere cambiate o lavate periodicamente
- Limitare l'utilizzo di indumenti contenenti fibre sintetiche
- La biancheria intima va cambiata frequentemente, come pure gli asciugamani
- Nel neonato, evitare il ristagno di urina o feci sulla cute cambiando frequentemente il pannolino
- Sottoporre cani e gatti a visita veterinaria prima di accoglierli nell'ambiente domestico

- Qualora un membro della famiglia manifesti una micosi è consigliabile osservare ulteriori precauzioni igieniche, come tenere separati gli indumenti e lavarli ad elevata temperatura.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

La crema è elettivamente indicata per il trattamento delle zone cutanee glabre (senza peli).

Quanto

CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA crema va applicato in piccole quantità 2-3 volte al giorno, in corrispondenza delle zone affette. Considerata l'elevata attività fungicida del clotrimazolo, è di norma sufficiente l'applicazione di una piccola quantità di crema per il trattamento di una superficie della grandezza del palmo di una mano.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

In genere, per la scomparsa delle manifestazioni è sufficiente un periodo di trattamento di tre-quattro settimane. Al fine di consolidare i risultati terapeutici ottenuti ed evitare reinfezioni è opportuno proseguire la terapia con CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA crema per almeno 2 settimane dopo la scomparsa delle manifestazioni.

Dopo tre-quattro settimane di impiego continuativo senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Consultate il medico anche se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Come

CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA crema va applicato frizionando leggermente, dopo aver lavato ed asciugato accuratamente la parte.

COSA FARE SE AVETE APPLICATO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

Non sono state riscontrate segnalazioni di effetti tossici del clotrimazolo, riferibili ad applicazioni di dosi eccessive del medicinale.

In caso di ingestione accidentale di CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA crema avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

COSA FARE SE AVETE DIMENTICATO DI PRENDERE UNA O PIÙ DOSI

Continuare il trattamento come da posologia consigliata.

EFFETTI DOVUTI ALLA SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO

Nessun effetto.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA, rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA crema può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Raramente sono possibili, in un numero molto limitato di pazienti, lievi manifestazioni di intollerabilità locale quali bolle, fastidio o dolore, gonfiore, irritazione, desquamazione, prurito, eruzione cutanea, bruciore, che tuttavia scompaiono rapidamente. In soggetti predisposti, possono manifestarsi reazioni allergiche (svenimento, calo di pressione, affanno, orticaria).

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

COMPOSIZIONE

100 g di crema contengono:

Principio attivo: Clotrimazolo 1 g

Eccipienti: Sorbitano monostearato, polisorbato 60, cetil palmitato, **alcol cetostearilico**, ottildodecanolo, alcool benzilico, acqua depurata.

COME SI PRESENTA

CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA si presenta in forma di crema per uso cutaneo.

Il contenuto della confezione è di un tubo da 30 g.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

FARMAKOPEA S.p.A. – Via Cavriana, 14 - 20134 MILANO.

PRODUTTORE

Doppel farmaceutici S.r.l., Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: Febbraio 2013.

Agenzia Italiana del Farmaco