Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

GLUCOSAMINA SOLFATO FG 1500 mg polvere per soluzione orale
Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è GLUCOSAMINA SOLFATO FG e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere GLUCOSAMINA SOLFATO FG
3. Come prendere GLUCOSAMINA SOLFATO FG
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare GLUCOSAMINA SOLFATO FG
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è GLUCOSAMINA SOLFATO FG e a cosa serve

GLUCOSAMINA SOLFATO FG contiene il principio attivo glucosamina solfato che appartiene al gruppo di medicinali chiamati antinfiammatori e antireumatici, non steroidei.

Questo medicinale è utilizzato per alleviare i sintomi delle artrosi (primarie e secondarie), un tipo di malattia che colpisce le articolazioni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere GLUCOSAMINA SOLFATO FG

Non prenda GLUCOSAMINA SOLFATO FG
- se è allergico alla glucosamina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è allergico ai crostacei perché la glucosamina viene ottenuta dai crostacei;
- se soffre di una condizione chiamata fenilchetonuria, perché questo medicinale contiene aspartame (fonte di fenilalanina).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere GLUCOSAMINA SOLFATO FG.

Si rivolga al medico per escludere la presenza di altre malattie delle articolazioni che possono richiedere altri trattamenti specifici.

Prenda questo medicinale con cautela e si rivolga la medico se:
- soffre di problemi di intolleranza al glucosio, un tipo di zucchero; il medico controllerà i livelli degli zuccheri nel sangue e, in base alle sue condizioni di salute, potrà prescriverle insulina;
- ha una predisposizione alle malattie del cuore e delle arterie (malattie cardiovascolari); il medico dovrà controllare i livelli dei grassi nel sangue, in quanto questo medicinale può causare un aumento dei grassi nel sangue;
- soffre di asma, perché questo medicinale può causare un peggioramento dei sintomi;
- soffre di gravi disturbi ai reni o al fegato (grave insufficienza epatica o renale).

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Bambini e adolescenti
Questo medicinale non deve essere somministrato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età.

Altri medicinali e GLUCOSAMINA SOLFATO FG
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Prenda questo medicinale con cautela e si rivolga al medico se sta assumendo:
- anticoagulanti orali (warfarin, acenocumarolo), medicinali utilizzati per evitare la formazione di coaguli nel sangue. È necessario il controllo da parte del medico sia all'inizio della terapia che alla fine;
- tetraciclina, medicinali utilizzati per il trattamento delle infezioni causate da batteri.

Gravidanza, allattamento e fertilità
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non prenda GLUCOSAMINA SOLFATO FG se è in gravidanza, se sta allattando al seno, se ha problemi di fertilità o se deve sottoporsi a test di fertilità.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Se dopo l'assunzione di questo medicinale dovesse manifestare capogiri, sonnolenza, mal di testa o disturbi della vista, eviti di guidare veicoli e di usare macchinari.

GLUCOSAMINA SOLFATO FG contiene aspartame
Questo medicinale contiene una fonte di fenilalanina (aspartame). Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria.

GLUCOSAMINA SOLFATO FG contiene sorbitolo.
Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

GLUCOSAMINA SOLFATO FG contiene 151 mg di sodio per ogni bustina di polvere per soluzione orale. Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio

3. Come prendere GLUCOSAMINA SOLFATO FG

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Questo medicinale non è adatto per trattare problemi delle articolazioni occasionali (sintomatologie acute).

L'effetto di GLUCOSAMINA SOLFATO FG non è immediato. Il miglioramento dei sintomi può richiedere alcune settimane o più dall'inizio del trattamento. Se dopo 2-3 mesi di trattamento con questo medicinale non nota un miglioramento delle sue condizioni di salute, si rivolga al medico.

La dose raccomandata è di 1 bustina (1500 mg) una volta al giorno. Assuma il contenuto di una bustina dopo averlo sciolto in un bicchiere d'acqua.

Uso in persone anziane
Se è una persona anziana e non soffre di particolari disturbi, non è necessario aggiustare la dose.

Se prende più GLUCOSAMINA SOLFATO FG di quanto deve

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

In caso di assunzione/ingestione di una dose eccessiva di questo medicinale avverta immediatamente il medico o si rivolga la più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere GLUCOSAMINA SOLFATO FG
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati.

Comuni (possono interessare fino a 1 su 100 persone)
- mal di testa, stanchezza e sonnolenza;
- nausea, dolori addominali, indigestione, diarrea, stitichezza, aumento dell'emissione dei gas intestinali (meteorismo), dolore e sensazione di pesantezza allo stomaco, difficoltà di digestione (dispepsia).

Non comuni (possono interessare fino a 1 su 1.000 persone)
- irritazione della pelle, prurito e arrossamenti della pelle.

Non noti (la cui frequenza non può essere stabilita dai dati disponibili)
- reazione allergica;
- disturbi della vista;
- perdita dei capelli;
- difficoltà di respirazione (asma bronchiale);
- aumento dei livelli di zucchero (glucosio) nel sangue;
- si sono manifestati casi sporadici di aumento dei livelli di colesterolo nel sangue (ipercolesterolemia).

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare GLUCOSAMINA SOLFATO FG

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene GLUCOSAMINA SOLFATO FG
- Il principio attivo è glucosamina solfato sodio cloruro. Una bustina contiene 1884 mg di glucosamina solfato sodio cloruro, corrispondenti a 1500 mg di glucosamina solfato e a 384 mg di sodio cloruro.
- Gli altri componenti sono aspartame, sorbitolo, acido citrico, macrogol 4000, silice colloidale anidra.

Descrizione dell'aspetto di GLUCOSAMINA SOLFATO FG e contenuto della confezione
GLUCOSAMINA SOLFATO FG si presenta come polvere per sospensione orale.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Confezione da 20 bustine.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
FG S.r.l. Via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza)

Produttore
Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Volturno, 48 20089 Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).