**Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore**

**SEPTIDIL 0,175% soluzione cutanea**
Didecildimetilammonio cloruro

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.**
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

**Contenuto di questo foglio:**
1. Cos'è SEPTIDIL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare SEPTIDIL
3. Come usare SEPTIDIL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare SEPTIDIL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

## 1. Cos'è SEPTIDIL e a cosa serve

SEPTIDIL contiene il principio attivo didecildimetilammonio cloruro che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che riducono o bloccano la crescita dei batteri.

SEPTIDIL è indicato per pulire e disinfettare:
- la pelle, sia integra che in presenza di ferite superficiali di piccole dimensioni;
- le mani;
- il campo operatorio prima di un intervento chirurgico.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni di trattamento.

## 2. Cosa deve sapere prima di usare SEPTIDIL

**Non usi SEPTIDIL:**
- se è allergico al didecildimetilammonio cloruro o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

**Avvertenze e precauzioni**
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare SEPTIDIL.

Questo medicinale deve essere applicato solo sulla pelle (uso esterno).
Non applichi SEPTIDIL sugli occhi.
SEPTIDIL non deve essere ingerito né inalato in quanto si possono verificare gravi conseguenze, anche mortali.



Documento reso disponibile da AIFA il 18/01/2022
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*
Agenzia Italiana del Farmaco

Dopo aver applicato questo medicinale sulla pelle, si raccomanda di non esporsi al sole o a lampade solari (sorgenti artificiali di raggi ultravioletti).

Non usi questo medicinale per trattamenti prolungati.

SEPTIDIL, soprattutto se utilizzato per lunghi periodi di tempo, può provocare reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione). In tal caso, è necessario interrompere il trattamento.

**Altri medicinali e SEPTIDIL**
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con SEPTIDIL, si raccomanda di evitare di usare altri medicinali simili (disinfettanti o detergenti).

**Septidil contiene etanolo**
Questo medicinale contiene 4,88 mg di alcol (etanolo) in 100 ml di soluzione, che equivale a 4,88% p/v.
Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Septidil contiene essenza a base di bergamotto a sua volta contenente geraniolo, citrale, limonene, linalolo.
Geraniolo, citrale, limonene e linalolo possono causare reazioni allergiche.

**Gravidanza e allattamento**
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Può usare questo medicinale se è in stato di gravidanza e se sta allattando al seno.

**Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**
Questo medicinale non altera la capacità di guidare o di usare macchinari.

## 3. Come usare SEPTIDIL
Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi il medicinale sulla zona interessata e su quella circostante, utilizzando un po’ di cotone o una garza, 2-3 volte al giorno.

Per disinfettare le mani, lavi ripetutamente con 5-6 ml di medicinale per almeno 1 minuto.

Non superi le dosi consigliate.

**Se usa più SEPTIDIL di quanto deve**
Se non supera le dosi consigliate, non c’è rischio di sovradosaggio.



Documento reso disponibile da AIFA il 18/01/2022
*Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di questo medicinale, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.
L'ingestione accidentale di questo medicinale può provocare nausea e vomito.
In caso di ingestione di elevate quantità di SEPTIDIL si possono manifestare sintomi quali: difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle (cianosi), sensazione di soffocamento (asfissia), dovuti all'arresto dei muscoli respiratori, riduzione dell'attività del cervello (depressione del sistema nervoso centrale), abbassamento della pressione del sangue (ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma) e morte.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare bruciore o irritazione della pelle (intolleranza).

**Segnalazione degli effetti indesiderati**
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. Come conservare SEPTIDIL

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere il prodotto dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**Cosa contiene SEPTIDIL**
- Il principio attivo è il didecildimetilammonio cloruro. 100 g di soluzione contengono 0, 175 g di didecildimetilammonio cloruro.

Gli altri componenti sono: etanolo 96%, essenza di bergamene (contiene geraniolo, citrale, limonene, linalolo), acqua depurata.

**Descrizione dell'aspetto di SEPTIDIL e contenuto della confezione**



Documento reso disponibile da AIFA il 18/01/2022
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

Flaconi da 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1 litro.

**Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore**
Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR) - Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Agenzia Italiana del Farmaco



Documento reso disponibile da AIFA il 18/01/2022
*Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*