Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

NEOXINAL ALCOLICO 0,5% + 70% soluzione cutanea
Clorexidina gluconato e alcool etilico

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o all'infermiere.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:
1. Cos'è NEOXINAL ALCOLICO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare NEOXINAL ALCOLICO
3. Come usare NEOXINAL ALCOLICO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare NEOXINAL ALCOLICO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è NEOXINAL ALCOLICO e a cosa serve

NEOXINAL ALCOLICO contiene due principi attivi: la clorexidina gluconato e l'alcool etilico che appartengono ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici. Questi medicinali agiscono disinfettando la pelle.

NEOXINAL ALCOLICO è indicato per pulire e disinfettare:
- la pelle, sia integra che in presenza di ferite superficiali di piccole dimensioni.;
- le mani prima di interventi chirurgici.

2. Cosa deve sapere prima di usare NEOXINAL ALCOLICO

Non usi NEOXINAL ALCOLICO:
- se è allergico alla clorexidina, a sostanze simili o all'alcool o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
-

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o all' infermiere prima di usare NEOXINAL ALCOLICO.

Questo medicinale può essere usato solo sulla pelle (uso esterno).
Questo medicinale è tossico per gli occhi, il cervello e le membrane che lo rivestono (meningi), per il midollo spinale e per la parte interna dell'orecchio. Pertanto, eviti il contatto di questo medicinale con queste zone del corpo.
L'ingestione o l'inalazione accidentale può causare gravi effetti indesiderati, compresa la morte.
Eviti di usare questo medicinale per periodi prolungati, in quanto se usa NEOXINAL ALCOLICO per molto tempo, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione).

Documento reso disponibile da AIFA il 22/04/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Non esponga la parte trattata alla luce del sole dopo l'applicazione.

Disinfezione del campo operatorio e di strumenti sanitari
Il medico o l'infermiere devono evitare:
- il contatto della sua pelle con eventuali materiali impregnati di questo medicinale prima di procedere con l'intervento;
- l'utilizzo di quantitativi eccessivi e l'accumulo nelle pieghe della pelle o sotto il corpo.

Prima di applicare una medicazione di tipo occlusivo su aree del corpo che sono state trattate con NEOXINAL ALCOLICO, è necessario assicurarsi che non sia presente un eccesso di medicinale in questa zona.

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. NEOXINAL ALCOLICO può provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e NEOXINAL ALCOLICO
Informi il medico o l'infermiere se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con NEOXINAL ALCOLICO eviti di usare altri disinfettanti o detergenti.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o all' infermiere prima di usare questo medicinale.
Può usare questo medicinale se è in gravidanza e se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non influenza la capacità di guidare o di usare macchinari.

3. Come usare NEOXINAL ALCOLICO

Questo medicinale sarà utilizzato solo da un medico o da personale specializzato.

Uso nella disinfezione della pelle
Applicare questo medicinale puro (non diluito) per disinfettare la pelle o le ferite utilizzando cotone o una garza imbevuti di NEOXINAL ALCOLICO e strofinando per almeno 30 secondi. Ripetere l'operazione per 2-3 volte al giorno.

Uso nella disinfezione delle mani
Per disinfettare le mani prima di un intervento chirurgico, lavarle ripetutamente con 5-6 ml di prodotto per almeno un minuto.
Non superi le dosi consigliate.

Documento reso disponibile da AIFA il 22/04/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Non usi quantitativi eccessivi del prodotto ed eviti che la soluzione si accumuli nelle pieghe cutanee o sotto il corpo del paziente o goccioli sulle lenzuola o altro materiale che potrebbe esserle a stretto contatto. Dove sia necessario applicare medicazioni occlusive ad aree precedentemente esposte a Neoxinal Alcolico, faccia particolare attenzione al fine di garantire che non sia presente prodotto in eccesso prima dell'applicazione della medicazione

Se usa più NEOXINAL ALCOLICO di quanto deve
Se non supera le dosi consigliate non c'è rischio di sovradosaggio.
L'ingestione o l'inalazione può causare gravi effetti indesiderati, compresa la morte.
In caso di ingestione/assunzione di una dose eccessiva di NEOXINAL ALCOLICO avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere valutata dai dati disponibili):
- bruciature (ustioni chimiche) nei neonati;
- bruciore e irritazione della pelle (intolleranza);
- se usa questo medicinale frequentemente possono verificarsi irritazione e secchezza della pelle.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare NEOXINAL ALCOLICO

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura inferiore a 30°C, nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce. Questo medicinale è facilmente infiammabile.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Documento reso disponibile da AIFA il 22/04/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene NEOXINAL ALCOLICO

- I principi attivi sono clorexidina gluconato e alcool etilico. 100 g di soluzione contengono 0,5 g di clorexidina digluconato e 70 g di alcol etilico 96%.
- Gli altri componenti sono: acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di NEOXINAL ALCOLICO e contenuto della confezione

24 flaconi da 250 ml, 12 flaconi da 250 ml, 20 flaconi da 500 ml, 10 flaconi da 500 ml, 12 flaconi da 1 litro, 6 flaconi da 1 litro di soluzione.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Produttore

Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Fleming 7 Zona industriale-37026 Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 22/04/2022

Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).