Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Lercanidipina ratiopharm Italia 10 mg compresse rivestite con film

Lercanidipina cloridrato

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Lercanidipina ratiopharm Italia e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia
3. Come prendere Lercanidipina ratiopharm Italia
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lercanidipina ratiopharm Italia
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Lercanidipina ratiopharm Italia e a che cosa serve

Lercanidipina ratiopharm Italia appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati bloccanti del canale del calcio (derivati della diidropiridina). Lercanidipina ratiopharm Italia è usato per trattare la **pressione arteriosa alta** da lieve a moderata, denominata anche ipertensione.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia

Non prenda Lercanidipina ratiopharm Italia
- Se è **allergico** alla lercanidipina cloridrato o ad **uno qualsiasi degli altri componenti di** questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se ha avuto **reazioni allergiche** a medicinali strettamente correlati a Lercanidipina ratiopharm Italia (quali amlodipina, nicardipina, felodipina, isradipina, nifedipina o lacidipina).
- Se soffre di **determinate malattie cardiache**:
  - insufficienza cardiaca non trattata;
  - ostruzione al flusso di sangue dal cuore;
  - angina instabile (angina a riposo o che aumenta progressivamente);
  - infarto da meno di un mese.
- Se ha **gravi problemi al fegato o ai reni**.
- Se sta prendendo **medicinali** che inibiscono l'isoenzima CYP3A4:
  - medicinali antimicotici (quali chetoconazolo o itraconazolo);
  - antibiotici macrolidi (quali eritromicina o troleandomicina);
  - antivirali (quali ritonavir).
- Se sta prendendo un altro farmaco denominato ciclosporina (usato dopo i trapianti per prevenire il rigetto d'organo).
- Se sta prendendo il pompelmo o il succo di pompelmo.

Non prenda questo medicinale se è **in gravidanza** o **sta allattando** (vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento" per ulteriori informazioni).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia se:

Documento reso disponibile da AIFA il 14/11/2018
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

- Ha problemi cardiaci e non ha un pacemaker, o se ha un'angina pre-esistente.
- Ha problemi al fegato o ai reni, o se è in dialisi.

Bambini e negli adolescenti.
Lercanidipina ratiopharm Italia **non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.**

Altri medicinali e Lercanidipina ratiopharm Italia
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Informi il medico o il farmacista se:
- Sta assumendo **betabloccanti**, per es. metoprololo, **diuretici** (compresse per urinare) o **ACE - inibitori** (medicinali per trattare la pressione arteriosa alta).
- Sta assumendo la **cimetidina** (più di 800 mg al giorno, un medicinale per ulcere, indigestione o bruciore di stomaco).
- Sta assumendo la **digossina** (un medicinale per trattare i problemi al cuore).
- Sta assumendo il **midazolam** (un medicinale che aiuta a dormire).
- Sta assumendo la **rifampicina** (un medicinale per trattare la tubercolosi).
- Sta assumendo l'**astemizolo o la terfenadina** (medicinali per le allergie).
- Sta assumendo l'**amiodarone o la chinidina** (medicinali per trattare un battito cardiaco accelerato).
- Sta assumendo la **fenitoina o la carbamazepina** (medicinali per l'epilessia). Il medico controllerà la sua pressione arteriosa con maggiore frequenza.
- Sta assumendo **antimicotici** (quali chetoconazolo o itraconazolo), antibiotici macrolidi (quali eritromicina o troleandomicina) o antivirali (quali ritonavir). L'effetto di Lercanidipina ratiopharm Italia può essere aumentato. Pertanto, la co-somministrazione deve essere evitata (vedere "Non usi Lercanidipina ratiopharm Italia").
- Sta assumendo la **ciclosporina** (un medicinale che riduce la resistenza dell'organismo alle malattie). L'effetto di Lercanidipina ratiopharm Italia così come della ciclosporina può essere aumentato. Pertanto, la co-somministrazione deve essere evitata (vedere "Non usi Lercanidipina ratiopharm Italia").
- Sta assumendo la **simvastatina** (un medicinale che riduce il livello di colesterolo). Lercanidipina ratiopharm Italia deve essere preso di mattina e la simvastatina di sera.

Lercanidipina ratiopharm Italia con cibi, bevande e alcol
- I pazienti **non devono consumare alcool** durante il trattamento con Lercanidipina ratiopharm Italia poiché può aumentare l'effetto di Lercanidipina ratiopharm Italia.
- I pazienti **non devono mangiare pompelmo o bere succo di pompelmo**.

Gravidanza e allattamento
Non prenda Lercanidipina ratiopharm Italia se è in gravidanza, se sta allattando, se desidera una gravidanza o se non sta usando alcun metodo contraccettivo.
Se sta prendendo Lercanidipina ratiopharm Italia e pensa di poter essere incinta, consulti il medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Presti attenzione perché esiste il rischio di capogiro, debolezza e stanchezza. Non guidi e non usi macchinari finché non conosce l'effetto che Lercanidipina ratiopharm Italia ha su di lei.

3. Come prendere Lercanidipina ratiopharm Italia

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti: la dose raccomandata è una compressa di Lercanidipina ratiopharm Italia (corrispondente a 10 mg di lercanidipina cloridrato) al giorno sempre alla stessa ora, preferibilmente di mattina **almeno**

Documento reso disponibile da AIFA il 14/11/2018
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

15 minuti prima di colazione, poiché un **pasto con un elevato contenuto di grassi aumenta significativamente i livelli di principio attivo nel sangue**. Il medico può consigliarle di aumentare la dose a due compresse di Lercanidipina ratiopharm Italia (corrispondenti a 20 mg di lercanidipina cloridrato) al giorno, se necessario.
La compressa deve essere ingerita con una sufficiente quantità di liquido (per es. un bicchiere d'acqua).

Anziani: non è necessaria alcuna modifica della dose giornaliera. Tuttavia, prestare particolare attenzione quando si inizia il trattamento.

Pazienti con problemi di fegato o reni: in questi pazienti, prestare particolare attenzione all'inizio del trattamento; un aumento della dose giornaliera a 20 mg deve essere effettuato con cautela.

Uso nei bambini e negli adolescenti
Questo medicinale non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni.

Se prende più Lercanidipina ratiopharm Italia di quando deve
Non superi la dose prescritta.
Se assume una quantità maggiore della dose prescritta, o in caso di sovradosaggio, consulti un medico immediatamente e, se possibile, porti con sé le compresse e/o il contenitore.

Superare il dosaggio corretto può causare un abbassamento eccessivo della pressione arteriosa e un battito cardiaco irregolare o accelerato. Può anche determinare vomito o incoscienza.

Se dimentica di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia
Se dimentica di prendere la sua compressa, non prenda quella dose e proceda con il trattamento come prima. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se interrompe il trattamento con Lercanidipina ratiopharm Italia
Se interrompe il trattamento con Lercanidipina ratiopharm Italia, la sua pressione arteriosa può aumentare di nuovo. Consulti il suo medico prima di interrompere il trattamento.
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Alcuni effetti indesiderati possono essere gravi:
Se si verifica uno qualsiasi di questi effetti indesiderati, contatti immediatamente il medico.
Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000): angina pectoris (dolore al torace causato da insufficiente apporto di sangue al cuore).

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000): dolore al torace, calo della pressione arteriosa, svenimento e reazioni allergiche (i sintomi includono prurito, eruzioni cutanee, orticaria).

Se soffre di angina pectoris pre-esistente, con il gruppo di medicinali a cui appartiene Lercanidipina ratiopharm Italia può verificarsi un aumento nella frequenza, nella durata o nella gravità di questi episodi acuti. Sono stati osservati casi isolati di infarto.

Altri possibili effetti indesiderati
Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100): mal di testa, capogiro, accelerazione del battito cardiaco, palpitazioni (tonfo al cuore o accelerazione del battito cardiaco), improvviso arrossamento del viso, del collo o della parte superiore del torace, gonfiore alla caviglia.

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000): sonnolenza, nausea, vomito, bruciore di stomaco, dolore allo stomaco, diarrea, eruzioni cutanee, dolore muscolare, minzione abbondante, stanchezza.

Documento reso disponibile da AIFA il 14/11/2018
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000): gonfiore alle gengive, alterazioni della funzionalità epatica (rilevate da esami del sangue), aumento della frequenza della minzione.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Lercanidipina ratiopharm Italia

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata su ciascun blister e sull'imballaggio esterno. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lercanidipina ratiopharm Italia

- Il principio attivo è la lercanidipina cloridrato.
  Ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di lercanidipina cloridrato, equivalenti a 9,4 mg di lercanidipina.
- Gli altri componenti sono

Nucleo della compressa:
amido di mais; sodio amido glicolato (tipo A); silice colloidale anidra; cellulosa microcristallina; poloxamer 188; sodio stearil fumarato; macrogol 6000.

Film di rivestimento:
ipromellosa; macrogol 6000; ossido di ferro giallo (E172); titanio diossido (E171).

Descrizione dell'aspetto di Lercanidipina ratiopharm Italia e contenuto della confezione

Le compresse di Lercanidipina ratiopharm Italia rivestite con film sono rotonde, biconvesse, di colore giallo, con linea di frattura su un lato e lisce sull'altro. La linea di frattura sulla compressa serve per agevolarne la rottura al fine di ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.

Confezioni: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 98, 100 compresse rivestite con film.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Teva B.V. - Swensweg 5 - 2031 GA Haarlem - Paesi Bassi

Produttore responsabile del rilascio dei lotti

Documento reso disponibile da AIFA il 14/11/2018
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren Germania

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Germania:	Lercanidipin-ratiopharm 10 mg Filmtabletten
Austria:	Lercanidipin-ratiopharm 10 mg Filmtabletten
Danimarca:	Lercanidipinhydrochlorid Teva
Italia:	Lercanidipina ratiopharm Italia 10 mg compresse rivestite con film
Portogallo:	Lercanidipina ratiopharm
Spagna:	Lercanidipino ratiopharm 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Agosto 2018

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 14/11/2018

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Lercanidipina ratiopharm Italia 20 mg compresse rivestite con film

Lercanidipina cloridrato

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Lercanidipina ratiopharm Italia e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia
3. Come prendere Lercanidipina ratiopharm Italia
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lercanidipina ratiopharm Italia
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Lercanidipina ratiopharm Italia e a che cosa serve

Lercanidipina ratiopharm Italia appartiene a un gruppo di medicinali chiamati bloccanti del canale del calcio (derivati della diidropiridina). Lercanidipina ratiopharm Italia è usato per trattare la **pressione arteriosa alta** da lieve a moderata, denominata anche ipertensione.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia

Non prenda Lercanidipina ratiopharm Italia
- Se è **allergico** alla lercanidipina cloridrato o **ad uno qualsiasi degli altri componenti** di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se ha avuto **reazioni allergiche** a medicinali strettamente correlati a Lercanidipina ratiopharm Italia (quali amlodipina, nicardipina, felodipina, isradipina, nifedipina o lacidipina).
- Se soffre di **determinate malattie cardiache**:
  - insufficienza cardiaca non trattata;
  - ostruzione al flusso di sangue dal cuore;
  - angina instabile (angina a riposo o che aumenta progressivamente);
  - infarto da meno di un mese.
- Se ha **gravi problemi al fegato o ai reni.**
- Se sta prendendo **medicinali** che inibiscono l'isoenzima CYP3A4:
  - medicinali antimicotici (quali chetoconazolo o itraconazolo);
  - antibiotici macrolidi (quali eritromicina o troleandomicina);
  - antivirali (quali ritonavir).
- Se sta prendendo un altro farmaco denominato ciclosporina (usato dopo i trapianti per prevenire il rigetto d'organo).
- Se sta prendendo il pompelmo o il succo di pompelmo.

Non prenda questo medicinale se è **in gravidanza** o **sta allattando** (vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento" per ulteriori informazioni).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia se:

Documento reso disponibile da AIFA il 14/11/2018
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

- Ha problemi cardiaci e non ha un pacemaker, o se ha un'angina pre-esistente.
- Ha problemi al fegato o ai reni, o se è in dialisi.

Bambini e negli adolescenti.
Lercanidipina ratiopharm Italia **non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.**

Altri medicinali e Lercanidipina ratiopharm italia
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Informi il medico o il farmacista se:
- Sta assumendo **betabloccanti**, per es. metoprololo, diuretici (compresse per urinare) o ACE-inibitori (medicinali per trattare la pressione arteriosa alta).
- Sta prendendo la **cimetidina** (più di 800 mg al giorno, un medicinale per ulcere, indigestione o bruciore di stomaco).
- Sta assumendo la **digossina** (un medicinale per trattare i problemi al cuore).
- Sta assumendo il **midazolam** (un medicinale che aiuta a dormire).
- Sta assumendo la **rifampicina** (un medicinale per trattare la tubercolosi).
- Sta assumendo l'**astemizolo o la terfenadina** (medicinali per le allergie).
- Sta assumendo l'**amiodarone o la chinidina** (medicinali per trattare un battito cardiaco accelerato).
- Sta assumendo la **fenitoina o la carbamazepina** (medicinali per l'epilessia). Il medico controllerà la sua pressione arteriosa con maggiore frequenza.
- Sta assumendo **antimicotici** (quali chetoconazolo o itraconazolo), antibiotici macrolidi (quali eritromicina o troleandomicina) o antivirali (quali ritonavir). L'effetto di Lercanidipina ratiopharm Italia può essere aumentato. Pertanto, la co-somministrazione deve essere evitata (vedere "Non usi Lercanidipina ratiopharm Italia").
- Sta assumendo la **ciclosporina** (un medicinale che riduce la resistenza dell'organismo alle malattie). L'effetto di Lercanidipina ratiopharm Italia così come della ciclosporina può essere aumentato. Pertanto, la co-somministrazione deve essere evitata (vedere "Non usi Lercanidipina ratiopharm Italia").
- Sta assumendo la **simvastatina** (un medicinale che riduce il livello di colesterolo). Lercanidipina ratiopharm Italia deve essere preso di mattina e la simvastatina di sera.

Lercanidipina ratiopharm Italia con cibi, bevande e alcol
- I pazienti **non devono consumare alcool** durante il trattamento con Lercanidipina ratiopharm Italia poiché può aumentare l'effetto di Lercanidipina ratiopharm Italia.
- I pazienti **non devono mangiare pompelmo o bere succo di pompelmo**.

Gravidanza e allattamento
Non prenda Lercanidipina ratiopharm Italia se è in gravidanza, se sta allattando, se desidera una gravidanza o se non sta usando alcun metodo contraccettivo.
Se sta prendendo Lercanidipina ratiopharm Italia e pensa di poter essere incinta, consulti il medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Presti attenzione perché esiste il rischio di capogiro, debolezza e stanchezza. Non guidi e non usi macchinari finché non conosce l'effetto che Lercanidipina ratiopharm Italia ha su di lei.

3. Come prendere Lercanidipina ratiopharm italia

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Documento reso disponibile da AIFA il 14/11/2018
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Adulti: la dose raccomandata è 10 mg di lercanidipina cloridrato al giorno sempre alla stessa ora, preferibilmente di mattina **almeno 15 minuti prima di colazione**, poiché un **pasto con un elevato contenuto di grassi aumenta significativamente i livelli di principio attivo nel sangue**. La dose di 10 mg non è possibile con le compresse descritte in questo foglio. Il medico può consigliarle di aumentare la dose a 20 mg di lercanidipina cloridrato al giorno corrispondenti a una compressa al giorno di Lercanidipina ratiopharm Italia 20 mg, se necessario.
La compressa deve essere ingerita con una sufficiente quantità di liquido (per es. un bicchiere d'acqua).

Anziani: non è necessaria alcuna modifica della dose giornaliera. Tuttavia, prestare particolare attenzione quando si inizia il trattamento.

Pazienti con problemi di fegato o reni: in questi pazienti, prestare particolare attenzione all'inizio del trattamento; un aumento della dose giornaliera a 20 mg deve essere effettuato con cautela.

Uso nei bambini e negli adolescenti
Questo medicinale non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni.

Se prende più Lercanidipina ratiopharm Italia di quando deve
Non superi la dose prescritta.
Se assume una quantità maggiore della dose prescritta o in caso di sovradosaggio, consulti un medico immediatamente e, se possibile, porti con sé le compresse e/o il contenitore.

Superare il dosaggio corretto può causare un abbassamento eccessivo della pressione arteriosa e un battito cardiaco irregolare o accelerato. Può anche determinare vomito o incoscienza.

Se dimentica di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia
Se dimentica di prendere la sua compressa, non prenda quella dose e proceda con il trattamento come prima. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se interrompe il trattamento con Lercanidipina ratiopharm Italia
Se interrompe il trattamento con Lercanidipina ratiopharm Italia, la sua pressione arteriosa può aumentare di nuovo. Consulti il suo medico prima di interrompere il trattamento.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Alcuni effetti indesiderati possono essere gravi:
Se si verifica uno qualsiasi di questi effetti indesiderati contatti immediatamente il medico.
Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000): angina pectoris (dolore al torace causato da insufficiente apporto di sangue al cuore).

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000): dolore al torace, calo della pressione arteriosa, svenimento e reazioni allergiche (i sintomi includono prurito, eruzioni cutanee, orticaria).

Se soffre di angina pectoris pre-esistente, con il gruppo di medicinali a cui appartiene Lercanidipina ratiopharm Italia può verificarsi un aumento nella frequenza, nella durata o nella gravità di questi episodi acuti. Sono stati osservati casi isolati di infarto.

Altri possibili effetti indesiderati
Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100): mal di testa, capogiro, accelerazione del battito cardiaco, palpitazioni (tonfo al cuore o accelerazione del battito cardiaco), improvviso arrossamento del viso, del collo o della parte superiore del torace, gonfiore alla caviglia.

Documento reso disponibile da AIFA il 14/11/2018
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000): sonnolenza, nausea, vomito, bruciore di stomaco, dolore allo stomaco, diarrea; eruzioni cutanee, dolore muscolare, minzione abbondante, stanchezza.

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000): gonfiore alle gengive, alterazioni della funzionalità epatica (rilevate da esami del sangue), aumento della frequenza della minzione.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Lercanidipina ratiopharm Italia

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul blister e sull'imballaggio esterno. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lercanidipina ratiopharm Italia
- Il principio attivo è la lercanidipina cloridrato.
  Ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di lercanidipina cloridrato, equivalenti a 18,8 mg di lercanidipina.

- Gli altri componenti sono

Nucleo della compressa:
cellulosa microcristallina; amido di mais; sodio amido glicolato (tipo A); silice colloidale anidra; povidone K 30; sodio stearil fumarato.

Film di rivestimento:
ipromellosa; macrogol 6000; ossido di ferro rosso (E172); titanio diossido (E171).

Descrizione dell'aspetto di Lercanidipina ratiopharm Italia e contenuto della confezione
Le compresse di Lercanidipina ratiopharm Italia rivestite con film sono rotonde, biconvesse, di colore rosa, con linea di frattura su un lato e lisce sull'altro. La linea di frattura sulla compressa serve per agevolarne la rottura al fine di ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.

Confezioni: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 60, 98, 100 compresse rivestite con film.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Teva B.V. - Swensweg 5 - 2031 GA Haarlem - Paesi Bassi

Documento reso disponibile da AIFA il 14/11/2018
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Produttore responsabile del rilascio dei lotti
Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren Germania

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Germania:	Lercanidipin-ratiopharm 20 mg Filmtabletten
Austria:	Lercanidipin-ratiopharm 20 mg Filmtabletten
Danimarca:	Lercanidipinhydrochlorid Teva
Italia:	Lercanidipina ratiopharm Italia 20 mg compresse rivestite con film
Portogallo:	Lercanidipina ratiopharm
Spagna:	Lercanidipino ratiopharm 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Agosto 2018

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 14/11/2018
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).