

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Bronchodual® Tosse pastiglie molli Estratto secco di pianta di Timo

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5 giorni di trattamento.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è BRONCHODUAL Tosse e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere BRONCHODUAL Tosse
3. Come prendere BRONCHODUAL Tosse
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare BRONCHODUAL Tosse
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è BRONCHODUAL Tosse e a che cosa serve

BRONCHODUAL Tosse è un medicinale tradizionale di origine vegetale usato per la tosse grassa associata al raffreddore.

L'impiego di questo medicinale tradizionale di origine vegetale per le indicazioni terapeutiche summenzionate si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.

2. Cosa deve sapere prima di prendere BRONCHODUAL Tosse

Non prenda BRONCHODUAL Tosse

Se è allergico al timo, a un altro componente della famiglia delle Lamiacee o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Faccia particolare attenzione nell'assunzione di BRONCHODUAL Tosse

Se ha febbre, respiro affannoso o presenta un espettorato purulento si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Bambini

È sconsigliato l'impiego nei bambini di età inferiore ai 6 anni poiché non vi sono dati disponibili sufficienti e a causa del pericolo di ingestione involontaria della pastiglia molle intera.

Altri medicinali e BRONCHODUAL Tosse

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Non sono stati effettuati studi di interazione con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Consulti il medico o il farmacista prima di assumere il medicinale.

Poiché non vi sono dati disponibili, si sconsiglia l'assunzione durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di BRONCHODUAL Tosse

BRONCHODUAL Tosse contiene fruttosio e sorbitolo: se è a conoscenza di soffrire di intolleranza agli zuccheri consulti il medico prima di assumere questo medicinale.

Indicazioni per i diabetici: 1 pastiglia molle corrisponde a circa 0,1 unità pane. Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

3. Come prendere BRONCHODUAL Tosse

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Posologia

Adulti e adolescenti (12-18 anni)

1 - 2 pastiglie molli ogni 4 ore (4 volte al giorno). Se necessario, si può assumere fino ad un massimo di 12 pastiglie al giorno.

Popolazione pediatrica

La somministrazione nei bambini può avvenire solo dopo aver consultato il medico.

Bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni

1 pastiglia molle 3 volte al giorno.

Bambini di età inferiore ai 6 anni

L'uso di BRONCHODUAL Tosse è sconsigliato nei bambini di età inferiore ai 6 anni poiché non vi sono dati disponibili di sicurezza ed efficacia sufficienti e a causa del pericolo di ingestione involontaria della pastiglia molle intera.

Durata del trattamento

La durata massima del trattamento è di 5 giorni. Se, dopo tale periodo di trattamento, non vi sono risultati apprezzabili, consulti il medico, poiché potrebbe esserci una malattia grave in atto.

Modo di somministrazione

Le pastiglie si devono sciogliere lentamente in bocca.

Se prende più BRONCHODUAL Tosse di quanto deve

In caso di sovradosaggio, gli effetti indesiderati noti si possono manifestare con maggiore intensità. In questo caso si rivolga al medico. Il medico potrà decidere le misure appropriate da adottare.

Se dimentica di prendere BRONCHODUAL Tosse

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati riscontrati i seguenti effetti indesiderati la cui frequenza non è nota

Disturbi del sistema immunitario

Reazioni di ipersensibilità, shock anafilattico, edema di Quincke

Patologie gastrointestinali

Disturbi gastrointestinali

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga **al medico o al farmacista**. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare BRONCHODUAL Tosse

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Conservare il blister nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "SCAD". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene BRONCHODUAL Tosse

1 pastiglia contiene:

59,5 mg di estratto (come estratto secco) di *Thymus vulgaris* L. o *Thymus zygis* L. (foglia e fiore di Timo) (7-13:1) corrispondente a 417-774 mg di *Thymi herba*. Solvente di estrazione: acqua.

Contenuto di olio essenziale nell'estratto pari a 1,3-1,7 mg (1,5-2,0%).

Gli eccipienti sono:

gomma arabica (E 414), fruttosio, sorbitolo (E 420), maltodestrina, acido citrico (E 330), saccarina sodica (E 954), aroma di aronia, aroma ai frutti di bosco, paraffina liquida, cera d'api (E 901), acqua purificata.

Descrizione dell'aspetto di BRONCHODUAL Tosse e contenuto della confezione

BRONCHODUAL Tosse sono pastiglie molli esagonali, di colore marrone. BRONCHODUAL Tosse è confezionato in blister in PVC/PE/PVdC/alu da 10, 20 o 40 pastiglie molli.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21, 1160 Vienna – Austria

Concessionario per la vendita:

Chefaro Pharma Italia srl

DIVISIONE FITOTERAPIA BRONCHENOLO – Roma

Produttore

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21, 1160 Vienna - Austria

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco