Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
OMKASA
1mg/ml collirio, soluzione
Acido salicilico
Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non riportati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è OMKASA e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare OMKASA
3. Come usare OMKASA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare OMKASA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è OMKASA e a cosa serve

OMKASA, a base di acido salicilico, è un medicinale avente azione antinfiammatoria e decongestionante.
OMKASA collirio si usa negli adulti per trattare le infiammazioni della palpebra (blefariti), le congiuntiviti aspecifiche e le irritazioni oculari causate da polvere, smog o sole.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 24-36 ore.

2. Cosa deve sapere prima di usare OMKASA

Non usi OMKASA:
- Se è allergico all'acido salicilico, ai salicilati in genere o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se ha sofferto di reazioni allergiche (asma, orticaria, rinite acuta) in caso di precedente uso di medicinali contenenti acido acetilsalicilico o anti-infiammatori non steroidei (medicinali utilizzati per curare l'infiammazione).
- Nel suo bambino se ha meno di 12 anni.

Se è in gravidanza o sta allattando al seno, veda paragrafo "Gravidanza e Allattamento".

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare OMKASA.

Eviti di portare lenti a contatto durante il trattamento con OMKASA.
In ogni caso deve togliere le lenti prima di applicare le gocce e attendere 15 minuti prima di riposizionarle.

In presenza o in caso di rischio di infezione, il medico potrebbe somministrarle contemporaneamente anche un medicinale antibiotico.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Bambini e adolescenti
L'acido salicilico è controindicato nella popolazione pediatrica al di sotto di 12 anni (vedere paragrafo "Non usi OMKASA).

Altri medicinali e OMKASA
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro collirio.

Nel caso stia assumendo anticoagulanti cumarinici (medicinali utilizzati per rendere più fluido il sangue), il medico le prescriverà con cautela OMKASA.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.
Il medico valuterà attentamente i benefici del medicinale per la mamma rispetto agli eventuali rischi per il feto.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Come tutti i colliri, OMKASA può provocare annebbiamento della vista per un breve periodo immediatamente dopo l'applicazione, alterando lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Non guidi veicoli e non usi macchinari fino a quando la sua vista non sia nitida.

3. Come usare OMKASA

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medicoo del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è una goccia 1-4 volte al giorno, da instillare nel sacco congiuntivale, secondo prescrizione medica.

Uso nei bambini e negli adolescenti
L'acido salicilico è controindicato nella popolazione pediatrica al di sotto di 12 anni.

Se usa più OMKASA di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di OMKASA collirio avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare OMKASA
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con OMKASA
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati si possono verificare con OMKASA:

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1000): reazioni allergiche locali.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10000): prurito, rossore degli occhi (iperemia oculare) e visione offuscata immediatamente dopo l'instillazione

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare OMKASA

Conservare a temperatura inferiore ai 25°C.
Il periodo di validità dopo prima apertura del flacone è di 28 giorni. Il prodotto residuo deve essere gettato.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "SCAD".
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene OMKASA

- Il principio attivo è acido salicilico. 1 ml di soluzione contiene acido salicilico 1 mg.

- Gli altri componenti sono: clorexidina digluconato; acido borico; sodio tetraborato; cloruro di sodio; sodio edetato; acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di OMKASA e contenuto della confezione
OMKASA collirio, soluzione si presenta in forma di soluzione limpida e trasparente in flacone di polietilene con contagocce. Ciascun flacone contiene 10 ml di collirio, soluzione.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Omikron Italia S.r.l. – Viale Bruno Buozzi 5, 00197 Roma

Produttore
Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestrasse 35
66129 Saarbrucken - Germania

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).